
Klinische Studienberichte zu drei inkretinbezogenen Peptiden

21. Oktober 2026

Indexierte klinische Arbeiten zu semaglutide, tirzepatide und retatrutide berichteten über Unterschiede zwischen den zugewiesenen Studienarmen bei der prozentualen Veränderung des Körpergewichts und erfassten unerwünschte Ereignisse. Jeder Hinweis nennt den Studientyp und eine Einschränkung. Es sind keine Anwendungshinweise enthalten.



Semaglutide

Studientyp: klinisch. Wilding und Kollegen (2021) berichteten über eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studie bei Erwachsenen mit Übergewicht oder Adipositas und ohne Diabetes. Nach 68 Wochen berichtete die Arbeit über eine größere mittlere prozentuale Abnahme des Körpergewichts im Arm semaglutide als im Placebo-Arm, und gastrointestinale Ereignisse wurden im aktiven Arm häufiger erfasst. Einschränkung: eine ausgewählte Population und ein festes Nachbeobachtungsfenster; der Bericht belegt keine Ergebnisse außerhalb dieses Designs.

Tirzepatide

Studientyp: klinisch. Jastreboff und Kollegen (2022) berichteten über eine randomisierte Phase-3-Studie bei Erwachsenen mit Adipositas oder mit Übergewicht plus einer gewichtsbezogenen Erkrankung und ohne Diabetes. Die Arbeit berichtete über größere mittlere prozentuale Veränderungen des Körpergewichts in den zugewiesenen Armen tirzepatide als unter Placebo nach 72 Wochen, wobei gastrointestinale Ereignisse zu den erfassten Ereignissen

Alle hier besprochenen Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen oder in der Veterinärmedizin. Nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

gehörten. Einschränkung: Eignungskriterien und Studiendauer begrenzen, wie weit die gemessenen Unterschiede gelesen werden können.

Retatrutide

Studientyp: klinisch. Jastreboff und Kollegen (2023) berichteten über eine randomisierte Phase-2-Studie. Die Arbeit berichtete über eine prozentuale Veränderung des Körpergewichts nach 48 Wochen, die sich zwischen den zugewiesenen Armen retatrutide und Placebo unterschied, und sie erfasste gastrointestinale Ereignisse. Einschränkung: Umfang und Dauer der Phase 2; die Arbeit ist kein abgeschlossener Datensatz einer späteren Phase.

Quellen

• Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. 2021. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183
• Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. 2022. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206038
• Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972

Alle besprochenen Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für den humanen oder veterinärmedizinischen Gebrauch. Nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung irgendeiner Krankheit bestimmt.