
Günstige und ungünstige Befunde zu Glutathione

3. November 2026

Randomisierte Studien berichten, dass eine längere orale Gabe von glutathione die Körperspeicher erhöhen und bestimmte Marker für oxidativen Stress bei gesunden Erwachsenen und einigen Patientengruppen verringern kann, doch eine Metaanalyse von RCTs aus dem Jahr 2025 fand keinen statistisch signifikanten ris

Chemische Identität und Katalogkontext

Glutathione (GSH, reduzierte Form; γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycin; $C_{10}H_{17}N_3O_6S$; CAS 70-18-8) ist das primäre intrazelluläre Thiol-Antioxidans und der Redoxpuffer und liegt in Säugetierzellen in millimolaren Konzentrationen vor. Es wird in zwei ATP-abhängigen Schritten synthetisiert: Glutamat-Cystein-Ligase (GCL, geschwindigkeitsbestimmend, häufig durch die Verfügbarkeit von Cystein begrenzt), gefolgt von der Glutathion-Synthetase. Das oxidierte Dimer (GSSG) wird durch die Glutathion-Reduktase unter Verwendung von NADPH recycelt. In der Laborforschung wird es als hochreines lyophilisiertes Pulver für mechanistische, In-vitro- und Tierstudien zu oxidativem Stress, Entgiftung, Xenobiotika-Konjugation über Glutathion-S-Transferasen (GSTs) und Redox-Signalgebung bereitgestellt. Die Materialien auf dieser Website sind ausschließlich für die Laborforschung bestimmt und sind keine Arzneimittel.




Abstrakte Darstellung, die berichtete günstige, Null- und ungünstige Befunde zu glutathione aus veröffentlichten Studien voneinander trennt.

Alle hier besprochenen Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen oder in der Veterinärmedizin. Nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

Biochemie, mechanistische In-vitro-Studien und präklinische Modelle

In-vitro-Studien zeigen, dass GSH reaktive Sauerstoffspezies (ROS), Peroxide und Elektrophile direkt abfängt, Proteinthiole im reduzierten Zustand hält und an der Glutathionylierung als posttranslationaler Modifikation beteiligt ist, die Enzymaktivität und Signalgebung reguliert. Depletionsmodelle (Hemmung der GCL durch Buthioninsulfoximin) sensibilisieren Zellen gegenüber oxidativer Schädigung, während eine Supplementierung oder die Zugabe von Vorstufen das Redoxgleichgewicht wiederherstellt. Methodenarbeiten beschreiben empfindliche HPLC-, enzymatische Recycling-Assays und Massenspektrometrie-Protokolle für kompartimentspezifische GSH/GSSG-Verhältnisse.

Tiermodelle (Nagetier-Lebertoxizität, Ischämie-Reperfusion, Parkinson-Neurotoxin, Alterung, metabolisches Syndrom) zeigen durchgängig, dass GSH oder Vorstufen (N-acetylcysteine, glycine) oxidative Schäden abschwächen, die mitochondriale Funktion erhalten, Entzündungen verringern und histologische sowie funktionelle Ergebnisse in Leber-, Hirn- und Stoffwechselgeweben verbessern. Diese präklinischen Daten belegen die biologische Plausibilität protektiver Rollen bei Zuständen oxidativen Stresses. Aus solchen Modellen abgeleitete Theorie legt nahe, dass ähnliche Mechanismen bei Personen mit GSH-Depletion wirken könnten; dies bleibt jedoch theoretisch und ist keine nachgewiesene Eigenschaft von Forschungsmaterial.



Schema zur Veranschaulichung des Spektrums von In-vitro-, Tier- und Humanbefunden zur glutathione-Homöostase.


Alle hier besprochenen Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen oder in der Veterinärmedizin. Nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

Günstig berichtete Befunde in Humanstudien

A 6-month randomised, double-blind, placebo-controlled trial (Richie et al., 2015, PMID 24791752, clinical) in 54 healthy non-smoking adults found that oral glutathione at 250 mg/day or 1,000 mg/day increased GSH levels versus baseline in blood, erythrocytes, plasma, and lymphocytes (30–35 % at high dose at 6 months) and dramatically in buccal mucosal cells (up to 260 %). The oxidised-to-reduced ratio decreased, indicating lower oxidative stress, and natural-killer cell cytotoxicity roughly doubled in the high-dose arm at 3 months. Levels generally returned toward baseline after a 1-month washout. Limitations include modest sample size and focus on biomarkers rather than hard clinical endpoints. 1 2

A randomised clinical trial in elderly patients with type 2 diabetes (2022, clinical) reported that 500 mg/day oral glutathione for 6 months increased blood GSH, decreased 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (oxidative DNA damage marker), and helped stabilise HbA1c and fasting insulin, with larger effects in participants above 55 years. A network meta-analysis of randomised trials for chemotherapy-induced peripheral neuropathy (2026, clinical) associated glutathione with reduced incidence of grade 3/4 neuropathy (OR 0.34), although benefit for all-grade neuropathy was not significant and sensitivity analyses restricted to double-blind studies weakened the signal. Small trials and pilots have reported modest reductions in melanin index (sun-exposed skin) with oral glutathione (250–500 mg/day) and improvements in liver enzymes or fat in selected NAFLD cohorts. Reviews of GlyNAC (glycine + N-acetylcysteine) supplementation in older adults note consistent rises in GSH accompanied by improvements in mitochondrial function, inflammation, insulin resistance, and physical performance markers. These findings make it plausible that supporting glutathione status could mitigate aspects of oxidative burden in specific deficient or stressed populations, but this is theory and not equivalent to proven therapeutic efficacy of the research compound. 3

Alle hier besprochenen Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen oder in der Veterinärmedizin. Nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.




Abstrakte Darstellung günstiger Biomarker-Verschiebungen im Kontrast zu ausbleibender klinischer Translation und Sicherheitssignalen.

Null-, gemischte oder inkonsistente Human-Evidenz

A 2025 systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials (clinical) concluded there was no statistically significant difference in glutathione levels in erythrocytes (standardised mean difference 0.74, 95 % CI –0.44 to 1.91, p = 0.22) or plasma (SMD 0.44, 95 % CI –0.21 to 1.09, p = 0.19) between supplementation and placebo arms. The authors highlighted high risk of bias in result reporting, small samples, variable durations, doses, and formulations, and heterogeneity. A 4-week randomised trial in healthy adults similarly found no significant change in red-blood-cell glutathione or oxidative stress markers with 1 g/day oral glutathione. Systematic reviews of glutathione for skin lightening (2019 and later updates, clinical/review) describe the evidence as inconclusive owing to small study sizes, inconsistent findings across body sites, temporary effects that reverse after discontinuation, and methodological limitations; one placebo-controlled intravenous trial for skin lightening missed statistical significance. Randomised trials of intranasal or intravenous glutathione in Parkinson’s disease (clinical) generally showed improvements no greater than placebo on primary motor and non-motor scales despite occasional biomarker shifts. Meta-analyses in acute respiratory distress syndrome and other critical-care settings have not demonstrated mortality benefit. Many claimed benefits rest on surrogate biomarkers whose relationship to clinically meaningful outcomes is uncertain, and effects appear context-, dose-, duration-, and formulation-dependent. 4

Alle hier besprochenen Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen oder in der Veterinärmedizin. Nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.



Visuelle Zusammenfassung des Gleichgewichts zwischen positiven Biomarkerdaten, null-meta-analytischen Ergebnissen und dokumentierten Risiken.

Sicherheitsprofil, unerwünschte Ereignisse und regulatorischer Kontext

Orales Glutathion wurde in kurz- bis mittelfristigen Studien (bis zu 6 Monaten) im Allgemeinen gut vertragen; leichte gastrointestinale Beschwerden (Blähungen, Übelkeit) wurden mit Häufigkeiten ähnlich wie unter Placebo berichtet. Vorübergehende Anstiege der Leberenzyme, die nach dem Absetzen abklangen, wurden bei einzelnen Teilnehmenden festgestellt. Die Langzeitsicherheit (>6–12 Monate) bei gesunden oder erkrankten Populationen ist nicht gut charakterisiert.

Intravenöses und als Rezeptur hergestelltes injizierbares Glutathion bergen dokumentierte Risiken. FDA-Warnhinweise (einschließlich Mitteilungen aus den Jahren 2019 und 2026) haben mehrere Häufungen unerwünschter Ereignisse hervorgehoben—Fieber, Schüttelfrost, Rigor, Hypotonie, Gliederschmerzen und eine sepsisähnliche Erkrankung—, die mit einer Endotoxinkontamination in Verbindung gebracht wurden, wenn Pulver in Nahrungsergänzungsmittelqualität zur Herstellung steriler Injektabilia verwendet wurde. Dutzende Fälle in mehreren Bundesstaaten führten zu Krankenhausaufenthalten und Produktrückrufen. Fallberichte und Übersichtsarbeiten dokumentieren Anaphylaxie, Überempfindlichkeit, auffällige Leberfunktionstests und seltene schwere kutane Reaktionen (z. B. Stevens-Johnson-Syndrom) im Zusammenhang mit unregulierter intravenöser Anwendung, insbesondere zur kosmetischen Hautaufhellung. Regulierungsbehörden in mehreren

Alle hier besprochenen Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen oder in der Veterinärmedizin. Nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

Rechtsordnungen haben Warnungen oder Kontraindikationen für intravenöses Glutathion in kosmetischen Kontexten ausgesprochen und dabei das Fehlen belastbarer Wirksamkeitsdaten in Verbindung mit diesen Sicherheitssignalen angeführt. In onkologischen Kontexten kann erhöhtes Glutathion Tumorzellen vor oxidativen Schäden schützen, die durch bestimmte Chemotherapien induziert werden, was eine theoretische Sorge hinsichtlich einer Interferenz begründet; Tumoren regulieren glutathionbezogene Signalwege häufig hoch, um Überleben und Resistenz zu fördern.

Inhaliertes Glutathion wurde bei einigen Patientinnen und Patienten mit zystischer Fibrose oder reaktiver Atemwegserkrankung mit vorübergehenden Abnahmen der Lungenfunktion in Verbindung gebracht. Insgesamt sind die Sicherheitsdaten routen- und kontextspezifisch; die parenterale Verabreichung birgt in veröffentlichten Berichten höhere und besser dokumentierte Risiken als orale Formen.

Evidenzkontext, praktische Vorbehalte und Katalogimplikationen

Glutathion nimmt eine zentrale Stellung in der zellulären Redoxhomöostase ein, und die Laborforschung beleuchtet weiterhin seine Biochemie, Regulation und Rollen in Krankheitsmodellen. Humane Evidenz zeigt bei längerer oraler Gabe in einigen gut durchgeführten randomisierten Studien günstige Verschiebungen des Glutathionstatus sowie ausgewählter Biomarker für oxidativen Stress oder Immunfunktion, insbesondere bei höheren Dosen oder in Populationen mit offensichtlicher Depletion. Metaanalysen berichten jedoch häufig Null- oder inkonsistente Effekte auf zirkulierende Spiegel, klinische Endpunkte sind oft gering oder nicht anhaltend, und viele Studien sind klein, von kurzer Dauer, heterogen oder mit einem Biasrisiko behaftet. Die Bioverfügbarkeit bleibt ein praktischer Vorbehalt: Standard-orales Glutathion unterliegt einer erheblichen Hydrolyse durch intestinale und hepatische γ-Glutamyltranspeptidase, obwohl eine chronische Dosierung, liposomale/mizellare Formulierungen oder Vorläuferstrategien (Cystein-Donoren plus Glycin) dies in unterschiedlichem Maße umgehen können. Die intravenöse Gabe erreicht hohe Plasmaspitzen, ist jedoch logistisch aufwendig, intrazellulär nur kurzlebig und in realen Rezeptursettings mit Kontaminations- und Überempfindlichkeitsrisiken verbunden.

Für Laborforschende bleibt Glutathione ein wertvolles Werkzeug für mechanistische und präklinische Untersuchungen der Redoxbiologie, von Detoxifizierungswegen und von Modellen oxidativen Stresses. Die Übertragung auf einen Nutzen beim Menschen ist nicht geradlinig; Vorläuferansätze oder Lebensstil- und Ernährungsstrategien, die die endogene Synthese unterstützen, zeigen in Übersichtsarbeiten häufig konsistentere Effekte. Behauptungen einer breiten „Detox“-, Anti-Aging- oder kosmetischen Wirksamkeit übersteigen das Gewicht der derzeitigen randomisierten Evidenz. Künftige Studien sollten ausreichend gepowerte, langfristige, doppelblinde Studien mit klinisch relevanten Endpunkten, standardisierten Formulierungen und einer strengen Sicherheitsüberwachung priorisieren. Forschende sollten Veränderungen von Surrogat-Biomarkern vorsichtig interpretieren und anerkennen, dass günstige präklinische oder kurzfristige humane Daten nicht mit einer belegten Wirksamkeit oder Sicherheit des Forschungsmaterials für irgendeine therapeutische Anwendung gleichzusetzen sind.

Quellen

Alle hier besprochenen Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen oder in der Veterinärmedizin. Nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.

• Richie JP Jr, et al. Randomized controlled trial of oral glutathione supplementation on body stores of glutathione. Eur J Nutr. 2015. PMID: 24791752. DOI: 10.1007/s00394-014-0706-z.
• Mangkalopakorn P, et al. Glutathione Levels after Glutathione Supplementation: A Systematic Review and Meta-analysis. J Curr Sci Technol. 2025. DOI: 10.59796/jcst.V15N1.2025.90.
• Dilokthornsakul P, et al. The clinical effect of glutathione on skin color and other related skin conditions: A systematic review. J Cosmet Dermatol. 2019. PMID: 30895708. DOI: 10.1111/jocd.12910.
• Hauser RA, et al. Randomized, double-blind, pilot evaluation of intravenous glutathione in Parkinson's disease. Mov Disord. 2009. PMID: 19230029.
• Padowski JM, et al. Phase IIb Study of Intranasal Glutathione in Parkinson's Disease. J Parkinsons Dis. 2017. PMCID: PMC5438472.
• Kennedy L, et al. Role of Glutathione in Cancer: From Mechanisms to Therapies. Biomolecules. 2020. PMID: 33050144. DOI: 10.3390/biom10101429.
• Zusätzliche Übersichten zur CIPN-Netzwerk-Metaanalyse (2026), zu GlyNAC-Studien, zu IV-Sicherheitswarnungen (FDA-Mitteilungen 2019–2026) und zu Bioverfügbarkeitsstudien (Witschi 1992 und Folgestudien).

Alle Zitate stammen aus der Primärliteratur oder aus systematischen Synthesen; nicht begutachtete kommerzielle Quellen oder Forenquellen wurden ausgeschlossen. Wortzahl ca. 1.750.

Alle dargestellten Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen oder in der Veterinärmedizin. Nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder vorzubeugen.

Alle hier besprochenen Informationen und Produkte sind ausschließlich für den Labor- und Forschungsgebrauch bestimmt. Nicht für die Anwendung am Menschen oder in der Veterinärmedizin. Nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.