Informes de ensayos clínicos sobre mazdutide

21 de octubre de 2026

Cuatro artículos clínicos comunicaron cambios del peso corporal o de la HbA1c con mazdutide frente a placebo o dulaglutide, cada uno con limitaciones declaradas de población y de seguridad.



Los informes publicados sobre mazdutide que figuran a continuación se limitan a lo que declararon los artículos citados. Cada elemento indica el tipo de estudio y una limitación del registro recuperado. Los cambios numéricos son resultados del estudio, no declaraciones de uso clínico.

Clínico. Un ensayo de fase 3, doble ciego y controlado con placebo, en adultos chinos con obesidad, con o sin diabetes de tipo 2, comunicó un cambio medio del peso corporal de −16.65% en el grupo de mazdutide frente a −1.50% con placebo a lo largo de 60 semanas. El ensayo se llevó a cabo en 27 hospitales de China, con dieta y actividad como complementos. Los acontecimientos adversos motivaron la interrupción del tratamiento en el 2.9% del grupo de mazdutide frente al 0% con placebo. El registro no establece hallazgos fuera de esa población del ensayo.

Clínico. Un ensayo multicéntrico estadounidense de fase 2 controlado con placebo comunicó cambios medios por mínimos cuadrados del peso corporal a las 32 semanas de −7.3%, −15.6% y −18.1% en tres brazos de mazdutide, frente a −0.9% con placebo. La muestra fue de 179 participantes. Los acontecimientos gastrointestinales fueron los acontecimientos adversos más frecuentes, y la interrupción del tratamiento fue más frecuente en el brazo de dosis más alta (20%). El resumen no comunica resultados más allá del seguimiento indicado.

Clínico. Un ensayo de fase 3 en adultos chinos con diabetes de tipo 2 en tratamiento de base

Toda la información y los productos tratados son exclusivamente para uso en laboratorio e investigación. No para uso humano ni veterinario. No están destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

con antidiabéticos orales comunicó que dos brazos de mazdutide fueron superiores a dulaglutide en cuanto al cambio de la HbA1c a las 28 semanas, con diferencias medias por mínimos cuadrados de −0.24% y −0.30%. El comparador fue dulaglutide durante 28 semanas en una población de ensayo china. Los acontecimientos adversos surgidos durante el tratamiento más frecuentes fueron diarrea, náuseas y vómitos.

Clínico. En un ensayo de fase 3 en monoterapia en adultos chinos con diabetes de tipo 2 insuficientemente controlada con dieta y ejercicio, los cambios de la HbA1c en la semana 24 fueron de −1.57% y −2.15% en dos brazos de mazdutide frente a −0.14% con placebo. La comparación principal fue de 24 semanas de control con placebo en adultos chinos. Los acontecimientos adversos frecuentes fueron diarrea, disminución del apetito y náuseas. El resumen no comunica datos de resultados cardiovasculares.

Fuentes

• Treatment With 9-mg Mazdutide for Weight Reduction in Chinese Adults With Obesity: The GLORY-2 Randomized Clinical Trial (2026). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42251595/
• Efficacy and safety of mazdutide in adults with obesity or overweight: a US-based, multicentre, phase 2, randomised, placebo-controlled clinical trial (2026). https://doi.org/10.1016/S2213-8587(26)00160-9
• Mazdutide versus dulaglutide in Chinese adults with type 2 diabetes (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-025-10031-z
• Mazdutide versus placebo in Chinese adults with type 2 diabetes (2026). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41407859/

Toda la información y todos los productos tratados se destinan exclusivamente al uso de laboratorio y de investigación. No para uso humano ni veterinario. No destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Toda la información y los productos tratados son exclusivamente para uso en laboratorio e investigación. No para uso humano ni veterinario. No están destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.