
Informes de ensayos clínicos sobre tres péptidos relacionados con las incretinas

21 de octubre de 2026

Los artículos clínicos indexados sobre semaglutide, tirzepatide y retatrutide informaron de diferencias entre los brazos asignados en el cambio porcentual del peso corporal y registraron acontecimientos adversos. Cada nota indica el tipo de estudio y una limitación. No se incluye ninguna orientación de uso.



Semaglutide

Tipo de estudio: clínico. Wilding y colaboradores (2021) informaron de un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo en adultos con sobrepeso u obesidad y sin diabetes. A las 68 semanas, el artículo informó de una mayor reducción porcentual media del peso corporal en el brazo de semaglutide que en el brazo de placebo, y los acontecimientos gastrointestinales se registraron con mayor frecuencia en el brazo activo. Limitación: una población seleccionada y un periodo de seguimiento fijo; el informe no establece resultados fuera de ese diseño.

Tirzepatide

Tipo de estudio: clínico. Jastreboff y colaboradores (2022) informaron de un ensayo aleatorizado de fase 3 en adultos con obesidad, o con sobrepeso más una afección relacionada con el peso, y sin diabetes. El artículo informó de cambios porcentuales medios del peso corporal mayores en los brazos asignados de tirzepatide que con placebo a las 72 semanas, y los acontecimientos gastrointestinales figuraron entre los acontecimientos registrados. Limitación: los criterios de elegibilidad y la duración del ensayo restringen hasta qué punto pueden interpretarse las

Toda la información y los productos tratados son exclusivamente para uso en laboratorio e investigación. No para uso humano ni veterinario. No están destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

diferencias medidas.

Retatrutide

Tipo de estudio: clínico. Jastreboff y colaboradores (2023) informaron de un ensayo aleatorizado de fase 2. El artículo informó de un cambio porcentual del peso corporal a las 48 semanas que difería entre los brazos asignados de retatrutide y el placebo, y registró acontecimientos gastrointestinales. Limitación: tamaño y duración de la fase 2; el artículo no es un conjunto de datos completado de una fase posterior.

Fuentes

• Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. 2021. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183
• Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. 2022. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206038
• Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972

Toda la información y los productos tratados son exclusivamente para uso de laboratorio e investigación. No para uso humano ni veterinario. No destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.