
Rapports d’essais cliniques sur trois peptides liés aux incrétines

21 octobre 2026

Des articles cliniques indexés portant sur semaglutide, tirzepatide et retatrutide ont rapporté des différences entre les bras assignés quant à la variation en pourcentage du poids corporel et ont consigné des événements indésirables. Chaque note indique le type d’étude et une limite. Aucune indication d’utilisation n’est incluse.



Semaglutide

Type d’étude : clinique. Wilding et ses collègues (2021) ont rapporté un essai randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo, mené chez des adultes présentant un surpoids ou une obésité et sans diabète. À 68 semaines, l’article a rapporté une réduction moyenne en pourcentage du poids corporel plus importante dans le bras semaglutide que dans le bras placebo, et des événements gastro-intestinaux ont été consignés plus souvent dans le bras actif. Limite : une population sélectionnée et une fenêtre de suivi fixe ; le rapport n’établit pas de résultats en dehors de ce schéma.

Tirzepatide

Type d’étude : clinique. Jastreboff et ses collègues (2022) ont rapporté un essai randomisé de phase 3 chez des adultes présentant une obésité, ou un surpoids associé à une affection liée au poids, et sans diabète. L’article a rapporté des variations moyennes en pourcentage du poids corporel plus importantes dans les bras assignés tirzepatide qu’avec le placebo à 72 semaines, des événements gastro-intestinaux figurant parmi les événements consignés. Limite : les

Toutes les informations et tous les produits présentés sont destinés exclusivement à un usage en laboratoire et à la recherche. Non destinés à un usage humain ou vétérinaire. Non destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

critères d'éligibilité et la durée de l'essai limitent la portée dans laquelle les différences mesurées peuvent être lues.

Retatrutide

Type d'étude : clinique. Jastreboff et ses collègues (2023) ont rapporté un essai randomisé de phase 2. L'article a rapporté une variation en pourcentage du poids corporel à 48 semaines qui différait entre les bras assignés retatrutide et le placebo, et il a consigné des événements gastro-intestinaux. Limite : effectif et durée de phase 2 ; l'article n'est pas un jeu de données achevé de phase ultérieure.

Sources

• Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. 2021. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183
• Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. 2022. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206038
• Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972

Toutes les informations et tous les produits évoqués sont destinés exclusivement à un usage en laboratoire et à la recherche. Non destinés à un usage humain ou vétérinaire. Non destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.

Toutes les informations et tous les produits présentés sont destinés exclusivement à un usage en laboratoire et à la recherche. Non destinés à un usage humain ou vétérinaire. Non destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie.