
Rapporti di studi clinici su tre peptidi correlati alle incretine

21 ottobre 2026

Articoli clinici indicizzati su semaglutide, tirzepatide e retatrutide hanno riportato differenze tra i bracci assegnati nella variazione percentuale del peso corporeo e hanno registrato eventi avversi. Ciascuna nota indica il tipo di studio e una limitazione. Non è inclusa alcuna indicazione d’uso.



Semaglutide

Tipo di studio: clinico. Wilding e colleghi (2021) hanno riportato uno studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo in adulti con sovrappeso o obesità e senza diabete. A 68 settimane, l’articolo ha riportato una maggiore riduzione percentuale media del peso corporeo nel braccio semaglutide rispetto al braccio placebo, e gli eventi gastrointestinali sono stati registrati più spesso nel braccio attivo. Limitazione: una popolazione selezionata e una finestra di follow-up fissa; il rapporto non stabilisce risultati al di fuori di tale disegno.

Tirzepatide

Tipo di studio: clinico. Jastreboff e colleghi (2022) hanno riportato uno studio randomizzato di fase 3 in adulti con obesità, oppure con sovrappeso e una condizione correlata al peso, e senza diabete. L’articolo ha riportato variazioni percentuali medie del peso corporeo più ampie nei bracci assegnati a tirzepatide rispetto al placebo a 72 settimane, con eventi gastrointestinali tra gli eventi registrati. Limitazione: i criteri di eleggibilità e la durata dello studio limitano la portata con cui le differenze misurate possono essere interpretate.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Retatrutide

Tipo di studio: clinico. Jastreboff e colleghi (2023) hanno riportato uno studio randomizzato di fase 2. L'articolo ha riportato una variazione percentuale del peso corporeo a 48 settimane che differiva tra i bracci assegnati a retatrutide e il placebo, e ha registrato eventi gastrointestinali. Limitazione: dimensione e durata della fase 2; l'articolo non è un dataset completato di una fase successiva.

Fonti

• Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. 2021. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183
• Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. 2022. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206038
• Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.