
Risultati favorevoli e sfavorevoli su Glutathione

3 novembre 2026

Studi randomizzati riportano che un’assunzione orale prolungata di glutathione può aumentare le riserve corporee e ridurre alcuni marcatori di stress ossidativo in adulti sani e in alcuni gruppi di pazienti; tuttavia, una meta-analisi del 2025 di RCT non ha rilevato un ris statisticamente significativo

Identità chimica e contesto di catalogo

Glutathione (GSH, forma ridotta; γ-L-glutamyl-L-cysteinyl-glycine; $C_{10}H_{17}N_3O_6S$; CAS 70-18-8) è il principale antiossidante tiolico intracellulare e tampone redox, presente a concentrazioni millimolari nelle cellule di mammifero. È sintetizzato in due passaggi dipendenti dall’ATP: glutamate-cysteine ligase (GCL, limitante, spesso limitata dalla disponibilità di cysteine), seguita da glutathione synthetase. Il dimero ossidato (GSSG) è riciclato dalla glutathione reductase mediante NADPH. Nella ricerca di laboratorio è fornito come polvere liofilizzata ad alta purezza per studi meccanicistici, in vitro e su animali relativi a stress ossidativo, detossificazione, coniugazione di xenobiotici tramite glutathione S-transferases (GSTs) e segnalazione redox. I materiali presenti su questo sito sono destinati esclusivamente alla ricerca di laboratorio e non sono medicinali.




Rappresentazione astratta che separa i risultati favorevoli, nulli e sfavorevoli riportati su glutathione negli studi pubblicati.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Biochimica, studi meccanicistici in vitro e modelli preclinici

Studi in vitro dimostrano che il GSH elimina direttamente le specie reattive dell'ossigeno (ROS), i perossidi e gli elettrofili, mantiene i tioli proteici allo stato ridotto e partecipa alla glutationilazione come modificazione post-traduzionale che regola l'attività enzimatica e la segnalazione. I modelli di deplezione (inibizione della GCL mediante buthionine sulfoximine) sensibilizzano le cellule al danno ossidativo, mentre l'integrazione o l'aggiunta di precursori ripristina l'equilibrio redox. Articoli metodologici descrivono protocolli HPLC sensibili, saggi di riciclo enzimatico e protocolli di spettrometria di massa per i rapporti GSH/GSSG specifici di compartimento.

I modelli animali (tossicità epatica nei roditori, ischemia-riperfusione, neurotossina parkinsoniana, invecchiamento, sindrome metabolica) mostrano in modo coerente che GSH o i precursori (N-acetylcysteine, glycine) attenuano il danno ossidativo, preservano la funzione mitocondriale, riducono l'infiammazione e migliorano gli esiti istologici e funzionali nei tessuti epatici, cerebrali e metabolici. Questi dati preclinici stabiliscono la plausibilità biologica di ruoli protettivi negli stati di stress ossidativo. La teoria derivata da tali modelli suggerisce che meccanismi analoghi potrebbero operare nelle persone che presentano deplezione di GSH, ma ciò rimane teorico e non è una proprietà dimostrata del materiale di ricerca.



Schema che illustra lo spettro dei risultati in vitro, animali e umani sull'omeostasi del glutatione.


Risultati favorevoli riportati negli studi umani

A 6-month randomised, double-blind, placebo-controlled trial (Richie et al., 2015, PMID 24791752, clinical) in 54 healthy non-smoking adults found that oral glutathione at 250 mg/day

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

or 1,000 mg/day increased GSH levels versus baseline in blood, erythrocytes, plasma, and lymphocytes (30–35 % at high dose at 6 months) and dramatically in buccal mucosal cells (up to 260 %). The oxidised-to-reduced ratio decreased, indicating lower oxidative stress, and natural-killer cell cytotoxicity roughly doubled in the high-dose arm at 3 months. Levels generally returned toward baseline after a 1-month washout. Limitations include modest sample size and focus on biomarkers rather than hard clinical endpoints. 1 2

A randomised clinical trial in elderly patients with type 2 diabetes (2022, clinical) reported that 500 mg/day oral glutathione for 6 months increased blood GSH, decreased 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (oxidative DNA damage marker), and helped stabilise HbA1c and fasting insulin, with larger effects in participants above 55 years. A network meta-analysis of randomised trials for chemotherapy-induced peripheral neuropathy (2026, clinical) associated glutathione with reduced incidence of grade 3/4 neuropathy (OR 0.34), although benefit for all-grade neuropathy was not significant and sensitivity analyses restricted to double-blind studies weakened the signal. Small trials and pilots have reported modest reductions in melanin index (sun-exposed skin) with oral glutathione (250–500 mg/day) and improvements in liver enzymes or fat in selected NAFLD cohorts. Reviews of GlyNAC (glycine + N-acetylcysteine) supplementation in older adults note consistent rises in GSH accompanied by improvements in mitochondrial function, inflammation, insulin resistance, and physical performance markers. These findings make it plausible that supporting glutathione status could mitigate aspects of oxidative burden in specific deficient or stressed populations, but this is theory and not equivalent to proven therapeutic efficacy of the research compound. 3




Rappresentazione astratta di variazioni favorevoli dei biomarcatori contrapposte a una

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

traslazione clinica nulla e a segnali di sicurezza.

Evidenze umane nulle, miste o incoerenti

A 2025 systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials (clinical) concluded there was no statistically significant difference in glutathione levels in erythrocytes (standardised mean difference 0.74, 95 % CI –0.44 to 1.91, p = 0.22) or plasma (SMD 0.44, 95 % CI –0.21 to 1.09, p = 0.19) between supplementation and placebo arms. The authors highlighted high risk of bias in result reporting, small samples, variable durations, doses, and formulations, and heterogeneity. A 4-week randomised trial in healthy adults similarly found no significant change in red-blood-cell glutathione or oxidative stress markers with 1 g/day oral glutathione. Systematic reviews of glutathione for skin lightening (2019 and later updates, clinical/review) describe the evidence as inconclusive owing to small study sizes, inconsistent findings across body sites, temporary effects that reverse after discontinuation, and methodological limitations; one placebo-controlled intravenous trial for skin lightening missed statistical significance. Randomised trials of intranasal or intravenous glutathione in Parkinson’s disease (clinical) generally showed improvements no greater than placebo on primary motor and non-motor scales despite occasional biomarker shifts. Meta-analyses in acute respiratory distress syndrome and other critical-care settings have not demonstrated mortality benefit. Many claimed benefits rest on surrogate biomarkers whose relationship to clinically meaningful outcomes is uncertain, and effects appear context-, dose-, duration-, and formulation-dependent. 4



Sintesi visiva dell'equilibrio tra dati positivi sui biomarcatori, risultati meta-analitici nulli e rischi documentati.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Profilo di sicurezza, eventi avversi e contesto normativo

Il glutatione orale è stato generalmente ben tollerato negli studi a breve e medio termine (fino a 6 mesi), con lievi disturbi gastrointestinali (gonfiore addominale, nausea) segnalati con frequenze simili al placebo. Aumenti transitori degli enzimi epatici, risoltisi alla sospensione, sono stati osservati in partecipanti isolati. La sicurezza a lungo termine (>6–12 mesi) in popolazioni sane o con patologie non è ben caratterizzata.

Il glutatione per via endovenosa e il glutatione iniettabile allestito in galenica comportano rischi documentati. Gli avvisi della FDA (comprese le comunicazioni del 2019 e del 2026) hanno evidenziato molteplici cluster di eventi avversi — febbre, brividi, rigor, ipotensione, dolori corporei e quadri simil-settici — associati a contaminazione da endotossine quando polvere di grado integratore alimentare è stata utilizzata per allestire iniettabili sterili. Decine di casi in diversi Stati hanno determinato ricoveri ospedalieri e richiami di prodotto. Casi clinici e revisioni documentano anafilassi, ipersensibilità, alterazioni degli esami di funzionalità epatica e rare reazioni cutanee gravi (ad es. sindrome di Stevens–Johnson) associate all'uso endovenoso non regolamentato, in particolare per lo schiarimento cutaneo a fini cosmetici. Le autorità di regolamentazione di diverse giurisdizioni hanno emesso avvertenze o controindicazioni per il glutatione endovenoso in contesti cosmetici, citando la mancanza di dati solidi di efficacia unitamente a questi segnali di sicurezza. In contesti oncologici, un glutatione elevato può proteggere le cellule tumorali dal danno ossidativo indotto da alcune chemioterapie, sollevando un timore teorico di interferenza; i tumori sovraregolano frequentemente le vie correlate al glutatione per favorire la sopravvivenza e la resistenza.

Il glutatione inalato è stato associato a riduzioni transitorie della funzione polmonare in alcuni pazienti con fibrosi cistica o malattia delle vie aeree reattive. Nel complesso, i dati di sicurezza sono specifici per via di somministrazione e contesto, e la somministrazione parenterale comporta rischi più elevati e meglio documentati rispetto alle forme orali nelle pubblicazioni disponibili.

Contesto delle evidenze, avvertenze pratiche e implicazioni per il catalogo

Il glutatione occupa una posizione centrale nell'omeostasi redox cellulare, e la ricerca di laboratorio continua a chiarirne la biochimica, la regolazione e i ruoli nei modelli di malattia. Le evidenze nell'uomo mostrano variazioni favorevoli dello stato del glutatione e di biomarcatori selezionati di stress ossidativo o immunitari con la somministrazione orale prolungata in alcuni studi randomizzati ben condotti, in particolare a dosi più elevate o in popolazioni con apparente deplezione. Tuttavia, le meta-analisi riportano frequentemente effetti nulli o incoerenti sui livelli circolanti, gli esiti clinici sono spesso modesti o non sostenuti nel tempo, e molti studi sono di piccole dimensioni, di breve durata, eterogenei o presentano rischio di bias. La biodisponibilità rimane un'avvertenza pratica: il glutatione orale standard subisce una sostanziale idrolisi da parte della γ-glutamil transpeptidasi intestinale ed epatica, sebbene la somministrazione cronica, le formulazioni liposomiali/micellari o le strategie con precursori (donatori di cisteina più glicina) possano aggirare tale limite in misura variabile. La somministrazione endovenosa raggiunge picchi plasmatici elevati, ma è logisticamente complessa, di breve durata a livello intracellulare e associata a rischi di contaminazione e di ipersensibilità nei contesti reali di allestimento galenico.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Per i ricercatori di laboratorio, Glutathione rimane uno strumento prezioso per indagini meccanicistiche e precliniche sulla biologia redox, sulle vie di detossificazione e sui modelli di stress ossidativo. Il trasferimento al beneficio nell'uomo non è lineare; gli approcci con precursori o le strategie di stile di vita e alimentari che sostengono la sintesi endogena mostrano spesso effetti più coerenti nelle revisioni. Le affermazioni di ampia efficacia “detox”, anti-invecchiamento o cosmetica eccedono il peso delle attuali evidenze randomizzate. Gli studi futuri dovrebbero dare priorità a sperimentazioni in doppio cieco, a lungo termine e adeguatamente potenziate, con endpoint clinicamente rilevanti, formulazioni standardizzate e un monitoraggio rigoroso della sicurezza. I ricercatori dovrebbero interpretare con cautela le variazioni dei biomarcatori surrogati e riconoscere che dati preclinici favorevoli o dati umani a breve termine non equivalgono a un'efficacia o a una sicurezza accertate del materiale di ricerca per alcuna applicazione terapeutica.

Fonti

• Richie JP Jr, et al. Randomized controlled trial of oral glutathione supplementation on body stores of glutathione. Eur J Nutr. 2015. PMID: 24791752. DOI: 10.1007/s00394-014-0706-z.
• Mangkalopakorn P, et al. Glutathione Levels after Glutathione Supplementation: A Systematic Review and Meta-analysis. J Curr Sci Technol. 2025. DOI: 10.59796/jcst.V15N1.2025.90.
• Dilokthornsakul P, et al. The clinical effect of glutathione on skin color and other related skin conditions: A systematic review. J Cosmet Dermatol. 2019. PMID: 30895708. DOI: 10.1111/jocd.12910.
• Hauser RA, et al. Randomized, double-blind, pilot evaluation of intravenous glutathione in Parkinson’s disease. Mov Disord. 2009. PMID: 19230029.
• Padowski JM, et al. Phase IIb Study of Intranasal Glutathione in Parkinson’s Disease. J Parkinsons Dis. 2017. PMCID: PMC5438472.
• Kennedy L, et al. Role of Glutathione in Cancer: From Mechanisms to Therapies. Biomolecules. 2020. PMID: 33050144. DOI: 10.3390/biom10101429.
• Ulteriori rassegne sulla meta-analisi a rete della CIPN (2026), sugli studi GlyNAC, sugli avvisi di sicurezza IV (comunicazioni FDA 2019–2026) e sugli studi di biodisponibilità (Witschi 1992 e successivi).

Tutte le citazioni provengono dalla letteratura primaria o da sintesi sistematiche; sono state escluse fonti commerciali o di forum non sottoposte a revisione paritaria. Conteggio delle parole: circa 1.750.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all’uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.