Rapporti pubblicati su Oxytocin acetate


29 ottobre 2026

I rapporti pubblicati caratterizzano oxytocin acetate come il sale acetato dell’ormone nonapeptidico endogeno, con solide evidenze da sperimentazioni randomizzate e Cochrane per l’uso endovenoso nell’induzione del travaglio, nell’accelerazione e nell’emorragia postpartum pre

Identità chimica e contesto di catalogo

Oxytocin acetate è il sale acetato del nonapeptide ciclico (Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH_2 con un ponte disolfuro tra Cys^1 e Cys^6), identico all’oxytocin umano endogeno prodotto nell’ipotalamo e rilasciato dall’ipofisi posteriore. Agisce come agonista selettivo del recettore dell’oxytocin (OXTR), un recettore accoppiato a proteine G di tipo Gq che induce il rilascio intracellulare di calcio.

Riportare una sperimentazione sull’uomo non costituisce una guida a usare in tal modo il materiale di ricerca. I materiali di Rierink Compounds sono forniti esclusivamente per la ricerca di laboratorio.




Schema della struttura chimica del nonapeptide oxytocin con ponte disolfuro.

Scoperta fondativa, farmacologia recettoriale e studi meccanicistici in vitro

L'attività uterocontrattile di Oxytocin fu identificata da Henry Dale nel 1906. La struttura fu

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

elucidata e la molecola fu sintetizzata chimicamente per la prima volta nel 1953 da Vincent du Vigneaud, che ricevette il Premio Nobel per la Chimica nel 1955 per questo risultato e per il lavoro correlato sui composti dello zolfo. Studi in vitro su strisce uterine isolate hanno dimostrato contrazioni dose-dipendenti mediate dalla segnalazione di IP_3 e del calcio indotta da OXTR. Il clonaggio del recettore all'inizio degli anni Novanta ha consentito una caratterizzazione farmacologica dettagliata, che ha evidenziato un'elevata affinità per Oxytocin e una minore cross-reattività con i recettori di vasopressin. Articoli di metodo hanno perfezionato la sintesi, la stabilità in tamponi acetate e i sistemi di saggio per il legame recettoriale e l'attività dei secondi messaggeri (in_vitro and method papers, 1906–2020s).




Schema della segnalazione intracellulare mediata da OXTR.

Modelli animali preclinici di fisiologia riproduttiva, comportamento sociale, stress e metabolismo

Studi su roditori e primati non umani hanno mappato ruoli nel parto, nell'eiezione del latte, nel comportamento materno, nel legame di coppia (ad es. modelli di arvicola delle praterie), nell'estinzione della paura, nella modulazione dell'asse HPA e nell'antinocicezione. Topi knockout per OXTR presentano profondi deficit nel riconoscimento sociale e nelle cure materne. Modelli animali di obesità e disfunzione metabolica hanno mostrato effetti variabili sull'appetito e sul dispendio energetico. Modelli di stress e dipendenza riportano una riduzione del comportamento di tipo ansioso e un'alterazione della ricerca di sostanze con manipolazione di Oxytocin esogena o endogena (animal papers, 1960s–2026). Questi risultati hanno fornito una base meccanicistica per la ricerca traslazionale sull'uomo, ma hanno evidenziato importanti

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

differenze di specie, sesso e contesto.




Rappresentazione astratta delle tipologie di studio preclinico.

Studi randomizzati pivotali e sintesi Cochrane per indicazioni ostetriche

Centinaia di studi controllati randomizzati e molteplici meta-analisi a rete Cochrane (comprese revisioni che includono 61 studi sull'induzione del travaglio e 122 studi che coinvolgono >120.000 donne per la prevenzione dell'emorragia post-partum) stabiliscono l'oxytocin acetate per via endovenosa o intramuscolare come standard di cura per l'accelerazione del travaglio e la riduzione della perdita ematica 500mL. I regimi ad alto dosaggio possono abbreviare la durata del travaglio e ridurre la corioamnionite senza aumentare i tassi di taglio cesareo quando il monitoraggio fetale è adeguato. In contesti a risorse limitate e con monitoraggio limitato, l'accelerazione con oxytocin è stata associata a un aumento dei rischi di natimortalità, punteggi di Apgar bassi, rianimazione neonatale ed encefalopatia, verosimilmente mediati da un'iperstimolazione non riconosciuta (articoli clinici e di meta-analisi, anni 1960–2026). Combinazioni quali ergometrine più oxytocin o misoprostol più oxytocin si collocano talvolta in posizione superiore per la prevenzione del sanguinamento.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.



Panoramica schematica dei disegni degli studi randomizzati nelle diverse indicazioni.

Studi esplorativi di farmacologia clinica intranasale, neuropsichiatrici e metabolici

L’oxytocin per via intranasale (tipicamente 18–48 IU o dosi superiori nei protocolli di ricerca) è stato valutato in centinaia di studi per gli effetti sul riconoscimento delle emozioni, sulla fiducia, sull’empatia e sulla salienza sociale. Nel disturbo dello spettro autistico i risultati sono contrastanti: alcuni studi precedenti e di dimensioni minori, o meta-analisi, hanno riportato miglioramenti della responsività sociale (in particolare nei bambini più piccoli), mentre un ampio studio randomizzato nei bambini (n 290) non ha rilevato un beneficio complessivo sulla scala primaria di responsività sociale valutata dal caregiver, sebbene un’interazione con l’età abbia suggerito possibili segnali nel sottogruppo di 3–5 anni. Le meta-analisi degli studi sull’ASD mostrano effetti piccoli o non significativi sui sintomi nucleari dopo aver tenuto conto dell’eterogeneità e del bias.

Nella schizofrenia, le meta-analisi indicano un effetto modesto sui sintomi negativi. Studi randomizzati nei disturbi da uso di sostanze (17 studi su alcol, oppioidi, stimolanti, cannabis e nicotina) hanno riportato riduzioni non coerenti del craving, dell’astinenza o del consumo (positive in 3–4 di 11 studi per dominio), con elevato rischio di bias. Un RCT multicentrico del 2026 nel disturbo da uso di alcol (n=100, fino a 70 IU/day) non ha rilevato una riduzione significativa dei giorni di consumo elevato, ma ha osservato benefici secondari su rabbia e aggressività; il composto è stato ben tollerato. Una meta-analisi degli studi sull’assunzione di cibo ha mostrato una riduzione dell’assunzione nei partecipanti non psichiatrici, ma effetti nulli

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

nei disturbi dell’alimentazione o nella schizofrenia. Le meta-analisi sul dolore sono contrastanti: un’analisi aggregata di tre piccoli RCT non ha mostrato una riduzione significativa dell’intensità del dolore (g=0.31, 95% CI −0.10 to 0.73), sebbene una revisione narrativa abbia suggerito possibili benefici in condizioni specifiche quali il dolore lombare o l’emicrania. Le dimensioni dell’effetto complessive nelle ampie meta-analisi psichiatriche sono piccole (d 0.17–0.32) e fortemente dipendenti dal contesto, dalla dose, dal sesso e dall’anamnesi (ipotesi della salienza sociale), e molti studi recenti di maggiori dimensioni hanno restituito risultati nulli sugli endpoint primari (articoli di farmacologia clinica, RCT e meta-analisi, 1991–2026).




Illustrazione della sintesi delle evidenze tra tipi di studio.

Profilo di sicurezza, farmacocinetica e tollerabilità

L’ossitocina per via endovenosa richiede monitoraggio ospedaliero in quanto medicinale ad alta allerta. I rischi documentati comprendono tachisistolia/iperstimolazione uterina, intossicazione da acqua con iponatriemia (in particolare con infusione prolungata ad alto dosaggio e fluidi ipotonici), aritmie, ipotensione o ipertensione e potenziale sofferenza fetale o complicanze neonatali. La rottura uterina è un rischio raro ma grave in determinati scenari ostetrici. La somministrazione intranasale in contesti di ricerca (dosi singole o ripetute fino a diverse settimane) produce eventi avversi (irritazione nasale, cefalea, sete, lievi alterazioni comportamentali) generalmente lievi e statisticamente indistinguibili dal placebo in adulti sani, uomini anziani e alcune popolazioni cliniche. L’uso cronico per via intranasale negli adulti anziani non ha mostrato un impatto significativo sui parametri cardiovascolari, urinari o metabolici. I dati farmacocinetici indicano una breve emivita plasmatica (3–6 min dopo IV; effetti centrali più

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

prolungati postulati), una bassa e altamente variabile biodisponibilità intranasale verso il sistema nervoso centrale (0.7–3%in saggi sensibili), che contribuisce a una traduzione clinica incoerente. Le revisioni sistematiche sulla sicurezza intranasale in >1,500 partecipanti (1990–2011 e aggiornamenti successivi) confermano l'assenza di un profilo di effetti collaterali affidabile distinto dal placebo alle dosi di ricerca e l'assenza di esiti avversi gravi coerenti nell'uso controllato a breve termine (articoli su sicurezza, PK, revisioni e osservazionali, 1990–2026).

Revisioni sistematiche recenti, meta-analisi, contesto delle evidenze e limitazioni ricorrenti

Le sintesi recenti (2011–2026) confermano gradi di evidenza solidi per le indicazioni ostetriche, caratterizzando al contempo le applicazioni neuropsichiatriche e metaboliche come promettenti ma non conclusive. Le meta-analisi multiverso dimostrano che le dimensioni dell'effetto di sintesi possono variare in modo drammatico (d da −0.16 a 1.45) in funzione delle scelte analitiche, della popolazione (neurotipica vs clinica), del regime posologico (singolo vs ripetuto) e delle correzioni per il bias di pubblicazione. Le limitazioni ricorrenti comprendono un'elevata variabilità interindividuale nell'assorbimento nasale, una breve emivita, la dipendenza dal contesto (livelli basali di ossitocina, avversità infantili, sesso, contesto sociale), dimensioni campionarie ridotte in molti studi psichiatrici, un potenziale bias di pubblicazione e difficoltà di mascheramento dovute a sottili effetti percettivi. L'eterogeneità preclude conclusioni definitive per la maggior parte degli usi non ostetrici. Non esiste alcuna approvazione regolatoria per applicazioni intranasali o in flaconi per la ricerca al di fuori dei contesti ostetrici ospedalieri. Gli studi in corso continuano a perfezionare la stratificazione dei pazienti, il dosaggio ottimale e la combinazione con interventi comportamentali. Il lavoro futuro richiede studi più ampi e adeguatamente potenziati, con metodi di somministrazione migliorati e sottogruppi pre-specificati chiari (articoli di revisione e meta-analisi, 2011–2026).

Il corpus delle evidenze sottolinea oxytocin acetate come uterotonico di riferimento, con un lungo profilo di sicurezza sotto supervisione, mentre gli effetti centrali restano un ambito attivo di indagine farmacologica, con importanti vincoli metodologici e biologici. (Word count 1,750)

Fonti

• Effects of intranasal oxytocin in food intake and craving: A meta-analysis of clinical trials, 2021. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.08.011
• The effectiveness of oxytocin for treating substance use disorders: A systematic review of randomized placebo-controlled trials, 2023. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105185
• Evaluating the efficacy of oxytocin for pain management: An updated systematic review and meta-analysis, 2023. https://doi.org/10.1080/24740527.2023.2191114
• The effect of oxytocin nasal spray on social interaction in young children with autism: a randomized clinical trial, 2023. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01845-8
• Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis, 2025. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011689.pub4
• A review of safety, side-effects and subjective reactions to intranasal oxytocin in human research, 2011. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2011.02.006
• A multiverse meta-analysis of oxytocin administration studies, 2025. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2025.108489

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Tutte le informazioni e i prodotti discussi sono esclusivamente per uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.