
Resoconti di studio sul retatrutide da due articoli di fase 2 del 2023

20 ottobre 2026

Una breve nota per ricercatori su quanto riportato da due sperimentazioni di fase 2 pubblicate riguardo al retatrutide, con il tipo di studio e una limitazione per ciascuna. Nessuna indicazione d’uso.



Questa nota registra i risultati pubblicati su retatrutide. Non raccomanda l’uso nelle persone né negli animali.

Sperimentazione sull’obesità (clinica)

Jastreboff e colleghi (2023) hanno riportato una sperimentazione di fase 2 randomizzata, in doppio cieco e controllata con placebo, in adulti con obesità, oppure con sovrappeso e almeno una condizione correlata al peso, e senza diabete di tipo 2. L’articolo ha riportato la variazione percentuale del peso corporeo a 24 settimane come endpoint primario e ha inoltre riportato la variazione del peso a 48 settimane. Gli eventi gastrointestinali figuravano tra gli eventi avversi descritti. Limitazione: le dimensioni e il follow-up di fase 2 non stabiliscono esiti a più lungo termine, e questa nota non riporta i gruppi di dose.

Sperimentazione sul diabete di tipo 2 (clinica)

Rosenstock e colleghi (2023) hanno riportato uno studio di fase 2 randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo e con comparatore attivo, in adulti con diabete di tipo 2. Dulaglutide era il comparatore attivo nominato nell’articolo. Gli endpoint riportati includevano la variazione dell’emoglobina glicata e la variazione del peso corporeo; gli eventi gastrointestinali figuravano

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

tra gli eventi avversi elencati. Limitazione: popolazione e durata selezionate di fase 2; gli endpoint misurati nello studio non costituiscono una dichiarazione di uso indicato.

Non sono qui riassunti articoli in vitro o su modelli animali.

Fonti

• Triple–Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972
• Retatrutide, a GIP, GLP-1 and glucagon receptor agonist, for people with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo and active-controlled, parallel-group, phase 2 trial. 2023. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01053-X

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all’uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.

Tutte le informazioni e i prodotti trattati sono destinati esclusivamente all'uso di laboratorio e di ricerca. Non per uso umano o veterinario. Non destinati a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.