
Klinische onderzoeksrapporten over drie incretinegerelateerde peptiden

21 oktober 2026

Geïndexeerde klinische artikelen over semaglutide, tirzepatide en retatrutide rapporteerden verschillen tussen toegewezen armen in procentuele verandering van het lichaamsgewicht en registreerden ongewenste voorvallen. Elke notitie noemt he



Semaglutide

Studietype: klinisch. Wilding en collega's (2021) rapporteerden een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie bij volwassenen met overgewicht of obesitas en zonder diabetes. Na 68 weken rapporteerde het artikel een grotere gemiddelde procentuele afname van het lichaamsgewicht in de semaglutide-arm dan in de placebo-arm, en gastro-intestinale voorvallen werden vaker geregistreerd in de actieve arm. Beperking: één geselecteerde populatie en een vast follow-upvenster; het rapport stelt geen resultaten vast buiten dat ontwerp.

Tirzepatide

Studietype: klinisch. Jastreboff en collega's (2022) rapporteerden een gerandomiseerde fase 3-studie bij volwassenen met obesitas, of overgewicht plus een gewichtsgerelateerde aandoening, en zonder diabetes. Het artikel rapporteerde grotere gemiddelde procentuele veranderingen van het lichaamsgewicht in de toegewezen tirzepatide-armen dan met placebo na 72 weken, waarbij gastro-intestinale voorvallen tot de geregistreerde voorvallen behoorden. Beperking: inclusiecriteria en studieduur beperken hoe ver de gemeten verschillen kunnen

Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.

worden gelezen.

Retatrutide

Studietype: klinisch. Jastreboff en collega's (2023) rapporteerden een gerandomiseerde fase 2-studie. Het artikel rapporteerde procentuele verandering van het lichaamsgewicht na 48 weken die verschilde tussen de toegewezen retatrutide-armen en placebo, en het registreerde gastro-intestinale voorvallen. Beperking: omvang en duur van fase 2; het artikel is geen afgeronde dataset van een latere fase.

Bronnen

• Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. 2021. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183
• Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. 2022. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206038
• Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972

Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.