Gunstige en ongunstige bevindingen over GHK-Cu

27 oktober 2026

Preklinische studies naar GHK-Cu melden consistente stimulatie van collageensynthese, ontstekingsremmende effecten en versnelde wondgenezing in cel- en diermodellen. Humane topicale trials zijn klein en gemengd, met gunstige signalen in sel

Gunstige en ongunstige bevindingen over GHK-Cu

Geïndexeerde artikelen en systematische reviews uit 2026 karakteriseren GHK-Cu (glycyl-L-histidyl-L-lysine–kopercomplex) als een endogeen tripeptide-kopersignaal dat is bestudeerd voor weefselherstel, hermodellering van de extracellulaire matrix, ontstekingsremmende, antioxidatieve en genregulerende effecten, vooral in cel-, dier- en beperkte topicale humane modellen. Deze gegevens stellen gebruik van het onderzoeksflesje niet vast. Geen van de onderstaande samenvattingen is een gezondheidsclaim.



Abstract diagram dat gunstige gerapporteerde bevindingen over GHK-Cu scheidt (collageensynthese, wondherstel, genhermodellering).

Gunstige gerapporteerde bevindingen

Preklinische literatuur (in-vitromodellen met fibroblasten en keratinocyten, ex-vivohuid van de mens, knaagdier-, konijn- en varkensmodellen voor wonden en veroudering uit de jaren 1970–2026) meldt consistent dat GHK-Cu bij nanomolaire concentraties de synthese van type-I-collageen, elastine en glycosaminoglycanen stimuleert en matrixmetalloproteïnasen (MMP-1, MMP-2) en weefselremmers van metalloproteïnasen (TIMP-1) moduleert voor


Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.

gecontroleerde hermodellering. Het bevordert proliferatie en migratie van fibroblasten en keratinocyten, angiogenese (via opregulatie van VEGF en bFGF), onderdrukt pro-inflammatoire routes (NF-κB, IL-6, TGF-β1), heeft antioxidatieve effecten (Nrf2-route, verminderde ROS, ferritine-achtige activiteit) en leidt tot brede hermodellering van genexpressie (Connectivity Map-analyses melden effecten op duizenden genen die verschuiven naar een jeugdig, herstellend profiel). Diermodellen laten vaak versnelde wondcontractie, re-epithelialisatie, georganiseerde collageenafzetting, minder littekenvorming en fibrose, en bescherming in modellen van longemfyseem, colitis en stralingsschade zien. Microneedling of liposomale formuleringen verbeteren de dermale opname en biologische activiteit in ex-vivo- en varkenshuidmodellen aanzienlijk. 1 2

Beperkte topicale gegevens bij mensen omvatten een evaluator-geblindeerde, vehiculumgecontroleerde multicentertrial uit 1994 bij diabetische neuropathische voetulcera, die aanzienlijk hogere mediane sluitingspercentages (98,5% versus 60,8% vehiculum bij plantaire ulcera) en lagere infectiepercentages met GHK-Cu-gel onder gestandaardiseerde zorg meldde. Kleine gerandomiseerde of split-face cosmetische trials (doorgaans n = 13–71 vrouwen met fotoversoudering, 8–12 weken tweemaal daagse applicatie) hebben een toegenomen huiddichtheid en -dikte (echografie of biopt), een verminderd volume/diepte van fijne lijntjes en rimpels, verbeterde stevigheid, laxiteit, helderheid en uiterlijk, en hogere door patiënten gerapporteerde tevredenheid na laserresurfacing of in vergelijking met vitamine C of retinoïnezuur gemeld (één dijbioptstudie toonde een collageenrespons bij 70% van de GHK-Cu-deelnemers versus 50% vitamine C en 40% retinoïnezuur). Een kleine gerandomiseerde split-face-wenkbrauwstudie uit 2026 (n=18) met 2%-serum meldde een toegenomen haartelling en -dikte ten opzichte van de controlezijde. Eén synthese van 22 studies (n=1.124) meldde grote effectgroottes voor weefselregeneratie, vermindering van ontsteking en regeneratieve genexpressie. Systematische reviews uit 2026 beschrijven een “diepe, mechanistisch coherente” preklinische basis en een “redelijke biologische grond” voor regeneratieve en esthetische toepassingen. 3 4

Ongunstige gerapporteerde bevindingen

Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.




Abstract diagram dat nul- en ongunstige gerapporteerde bevindingen over GHK-Cu scheidt (gemengde trials, irritatie, hiaten in de gegevens).

Topicaal gebruik is in verband gebracht met lichte tot matige lokale irritatie, waaronder erytheem, droogheid, steken, pruritus of voorbijgaande “copper uglies” (dofheid of uitbraken) in gebruikersmeldingen, sommige cosmetische studies en een split-face-trial uit 2025 naar acnelittekens, die een mogelijk verhoogd risico op hyperpigmentatie opmerkte bij combinatie met dermarollen. Systematische registratie van bijwerkingen is in oudere artikelen vaak beperkt. Voor injecteerbare of systemische toediening zijn er nul gepubliceerde gecontroleerde humane farmacokinetische, veiligheids- of werkzaamheidstrails. FDA-beoordelingen (2026) benadrukken beperkte humane gegevens om veiligheidsgerelateerde overwegingen te informeren en wijzen op mogelijke immunogeniciteitsrisico’s door peptideaggregatie, onzuiverheden of inconsistente koperchelatie in samengesteld materiaal. Theoretische bezwaren omvatten koperdyshomeostase (gecontra-indiceerd bij de ziekte van Wilson of een verstoord kopermetabolisme) en mogelijke pro-angiogene effecten in contexten waarin nieuwe vaatgroei ongewenst zou kunnen zijn. Een opmerkelijk deel (~35%) van de primaire literatuur vermeldt de ontdekker Loren Pickart of gelieerde commerciële entiteiten (Skin Biology/ProCyte) als auteurs, wat reviews uit 2026 aanmerken als een beperking van de onafhankelijkheid van sommige positieve meldingen. Grotere vervolgprogramma’s voor diabetische ulcera zouden het positieve resultaat uit 1994 niet hebben gerepliceerd. 5 6

Nul-, niet-conclusieve of contextbeperkte resultaten

Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.




Abstract diagram dat de scheiding van gunstige, nul- en ongunstige gerapporteerde bevindingen over GHK-Cu illustreert.

Een gerandomiseerde evaluator-geblindeerde trial uit 1992 (86evalueerbare patiënten met veneuze beenulcera) vond dat 0,4% koper-tripeptidecrème geen genezingsvoordeel opleverde ten opzichte van vehiculumplacebo; zilversulfadiazine was superieur. Een gerandomiseerde studie uit 2006 na CO_2-laserresurfacing (13 completers) vond geen significante objectieve verschillen (computerbeoordeeld erytheem, door geblindeerde beoordelaars gescoorde rimpels en huidkwaliteit) tussen het GHK-Cu-regime en de controle, hoewel patiëntenvragenlijsten hogere tevredenheid toonden (P=0,04). De meeste studies bij mensen zijn klein (vaak n<50–70), kortdurend (8–12 weken), heterogeen in formulering, vehiculum, concentratie en eindpunten, en veel plaatsen GHK-Cu alleen als actieve comparator tegen vitamine C, EGF, tretinoïne, Pal-KTTKS of alleen microneedling, in plaats van als primair testartikel. In een review uit 2026 van 64 records (2005–2026) worden slechts drie relatief recente directe interventionele studies bij mensen (één pilot, één split-face, één casusreeks) uitgelicht. Er zijn geen gepubliceerde placebogecontroleerde trials die zelfstandige haargroei of omkering van grijs haar met geïsoleerd GHK-Cu aantonen; veel haarmeldingen gebruiken producten met meerdere ingrediënten of GHK-conjugaten. Transdermale penetratie van intact hydrofiel GHK-Cu is slecht zonder fysische of formuleringsversterkers; hoewel microneedling de opname in ex-vivo- en varkensmodellen sterk verbetert, bestaan er geen grote, voldoende gepowerde humane RCT's van de combinatie. Een lopende gerandomiseerde, vehiculumgecontroleerde split-wound fase-2-trial van topicale GHK-Cu-gel voor gestandaardiseerde acute punchbiopsiewonden (NCT07437586) werft deelnemers en heeft geen werkzaamheidsresultaten beschikbaar. Heterogeniteit in chemische speciatie (intact GHK-Cu versus apo-GHK versus labiel of vrij koper), stabiliteit en verificatie van afgifte verhindert meta-analyse en beperkt toeschrijving van

Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.

effecten. Claims over systemische anti-veroudering, metabole, neurologische of oncologische voordelen blijven volledig preklinisch. 1 7

Bewijscontext en terugkerende beperkingen



Abstract diagram dat gunstige, nul- en ongunstige gerapporteerde bevindingen voor het onderwerp GHK-Cu scheidt.

GHK-Cu werd in de jaren 1970 geïdentificeerd als een plasmafactor die koper met hoge affiniteit bindt en werkt als een matricryptinefragment dat bij weefselschade vrijkomt uit collageen en SPARC. Het dient als koperchaperonne voor lysyloxidase en lijkt herstelsignalering te verschuiven naar antifibrotische TGF-β3-routes. De preklinische bewijsbasis (cel, ex vivo, dier) over vier decennia wordt door systematische en evidence-mappingreviews uit 2026 beschreven als “mechanistisch coherent”, “diep” en ondersteunend voor regeneratieve, ontstekingsremmende, antioxidatieve en matrixhermodellerende rollen. De klinische vertaling is echter beperkt. Reviews van 20–64 studies (2005–2026) identificeren slechts 11studies bij mensen, waarvan er weinig GHK-Cu rechtstreeks als primaire interventie testen en slechts 2 als specifieke RCT’s in esthetische contexten kwalificeren. Methodologische variabiliteit (formulering, speciatie, dosis, afgifte, uitkomstmaten, follow-up), kleine steekproeven, aan de industrie gelieerd auteurschap in fundamenteel positief werk, surrogaateindpunten in plaats van voor de patiënt belangrijke eindpunten, en het ontbreken van langetermijngegevens van onafhankelijke bronnen keren terug als beperkingen. Afgifteproblemen (slechte passieve transdermale penetratie van het intacte complex) en onvolledige farmaceutische karakterisering (exacte koperbezetting, grenzen voor labiel koper, stabiliteit) worden herhaaldelijk benadrukt. Reviews concluderen uniform dat GHK-Cu “veelbelovend maar onbewezen” is en doen expliciete oproepen tot grotere, goed opgezette, onafhankelijke RCT’s met gestandaardiseerde, analytisch

Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.

gedefinieerde materialen, objectieve beeldvorming/biomarkers, geavanceerde afgifteplatforms (microneedle-arrays, oplosbare pleisters), langere follow-up en rigoureuze veiligheidsmonitoring bij indicaties zoals fotoversoudering, atrofische littekens, chronische wonden, reconstructie na Mohs en herstel na bestraling. De regulatoire context beperkt medische claims; topicale cosmetische verwerking bestaat in sommige producten, terwijl injecteerbare compounding onder veiligheidscontrole heeft gestaan (immunogeniciteit, beperkte humane gegevens). Er bestaat geen regulatoire goedkeuring voor therapeutisch gebruik. Het huidige corpus ondersteunt daarom voortgezet laboratoriumonderzoek naar mechanismen en formuleringwetenschap eerder dan klinische extrapolatie. Toekomstig werk zou onafhankelijke replicatie, duidelijke analytiek van de actieve entiteit en voldoende gepowerde trials prioriteit moeten geven om de translationele kloof te dichten. 1 3

Bronnen

• Najafi N, et al. A Systematic Review of the Mechanisms and Therapeutic Applications of GHK-Cu (Glycyl-L-Histidyl-L-Lysine-Copper Complex) in Topical Microneedle Delivery: A Case for Expanded Clinical Trials. Arch Intern Med Res. 2026. doi:10.26502/aimr.0255. PMID: 42787770. (64 records, 2005–2026; sterke preklinische basis, afgebakende kloof in humaan bewijs). 1
• Mokhtar J, et al. The Regenerative Potential of GHK-Cu in Aesthetic Medicine. Aesthet Surg J. 2026. (20 studies: 18 preklinisch, 2 RCT’s; consistent preklinisch maar beperkte goed opgezette klinische trials). 3
• Pickart L, Margolina A. Regenerative and Protective Actions of the GHK-Cu Peptide in the Light of the New Gene Data. Int J Mol Sci. 2018;19(7):1987. doi:10.3390/ijms19071987. PMID: 29986520. (commerciële context opgemerkt in sommige syntheses). 2
• Miller TR, et al. Effects of topical copper tripeptide complex on CO2 laser-resurfaced skin. Arch Facial Plast Surg. 2006;8(4):252-259. doi:10.1001/archfaci.8.4.252. PMID: 16847171. (nulbevindingen op objectieve uitkomsten). 7
• Bishop JB, et al. A prospective randomized evaluator-blinded trial of two potential wound healing agents for the treatment of venous stasis ulcers. J Vasc Surg. 1992;16(2):251-257. PMID: 1495150. (nul versus vehiculum). 4
• Aanvullende preklinische, wound-chamber-, fibroblast-, longschade-, genprofilering- en formuleringsartikelen (1988–2026) geïndexeerd op PubMed/Europe PMC; FDA-beoordelingen van de veiligheid van compounding (2026); lopende NCT07437586 fase-2-trial met topicale gel (wervend, geen resultaten).

Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.