
Studieverslagen over retatrutide uit twee fase 2-artikelen uit 2023

20 oktober 2026

Een korte onderzoeksnotitie over wat twee gepubliceerde fase 2-trials rapporteerden over retatrutide, met studietype en een beperking voor elk. Geen gebruiksadvies.



Deze notitie legt gepubliceerde bevindingen over retatrutide vast. Zij beveelt geen gebruik bij mensen of dieren aan.

Obesitastrial (klinisch)

Jastreboff en collega's (2023) rapporteerden een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 2-trial bij volwassenen met obesitas, of overgewicht met ten minste één gewichtsgerelateerde aandoening, en zonder diabetes type 2. Het artikel rapporteerde procentuele verandering in lichaamsgewicht na 24 weken als primair eindpunt en rapporteerde ook gewichtsverandering na 48 weken. Gastro-intestinale voorvallen behoorden tot de beschreven bijwerkingen. Beperking: de omvang en follow-up van fase 2 stellen geen langetermijnuitkomsten vast, en deze notitie herhaalt geen doseringsgroepen.

Diabetes type 2-trial (klinisch)

Rosenstock en collega's (2023) rapporteerden een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo- en actief gecontroleerde fase 2-trial bij volwassenen met diabetes type 2. Dulaglutide was de actieve comparator die in het artikel werd genoemd. Gerapporteerde eindpunten omvatten verandering in geglyceerd hemoglobine en verandering in lichaamsgewicht; gastro-intestinale voorvallen behoorden tot de vermelde bijwerkingen. Beperking: geselecteerde fase 2-populatie

Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.

en duur; gemeten trialeindpunten zijn geen uitspraak over geïndiceerd gebruik.

Hier worden geen in-vitro- of diermodelartikelen samengevat.

Bronnen

• Triple–Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972
• Retatrutide, a GIP, GLP-1 and glucagon receptor agonist, for people with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo and active-controlled, parallel-group, phase 2 trial. 2023. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01053-X

Alle informatie en producten die worden besproken, zijn uitsluitend bedoeld voor laboratorium- en onderzoeksgebruik. Niet voor menselijk of diergeneeskundig gebruik. Niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, te behandelen, te genezen of te voorkomen.