
Raporty z badań klinicznych dotyczące trzech peptydów związanych z inkretynami

21 października 2026

Zindeksowane prace kliniczne dotyczące semaglutide, tirzepatide i retatrutide opisywały różnice między przydzielonymi ramionami w procentowej zmianie masy ciała oraz rejestrowały zdarzenia niepożądane. Każda notatka podaje typ badania i ograniczenie. Nie zawarto wskazówek dotyczących stosowania.



Semaglutide

Typ badania: kliniczne. Wilding i współpracownicy (2021) opisali randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo u dorosłych z nadwagą lub otyłością i bez cukrzycy. Po 68 tygodniach praca podała większą średnią procentową redukcję masy ciała w ramieniu semaglutide niż w ramieniu placebo, a zdarzenia żołądkowo-jelitowe rejestrowano częściej w ramieniu aktywnym. Ograniczenie: jedna wybrana populacja i stałe okno obserwacji; raport nie ustala wyników poza tym schematem.

Tirzepatide

Typ badania: kliniczne. Jastreboff i współpracownicy (2022) opisali randomizowane badanie fazy 3 u dorosłych z otyłością albo z nadwagą oraz schorzeniem związanym z masą ciała, bez cukrzycy. Praca podała większe średnie procentowe zmiany masy ciała w przydzielonych ramionach tirzepatide niż w przypadku placebo po 72 tygodniach, a wśród rejestrowanych zdarzeń znalazły się zdarzenia żołądkowo-jelitowe. Ograniczenie: kryteria kwalifikacji i czas trwania badania ograniczają zakres, w jakim można odczytywać zmierzone różnice.

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani do użytku weterynaryjnego. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Retatrutide

Typ badania: kliniczne. Jastreboff i współpracownicy (2023) opisali randomizowane badanie fazy 2. Praca podała procentową zmianę masy ciała po 48 tygodniach, która różniła się między przydzielonymi ramionami retatrutide a placebo, oraz zarejestrowała zdarzenia żołądkowo-jelitowe. Ograniczenie: liczebność i czas trwania fazy 2; praca nie stanowi ukończonego zbioru danych późniejszej fazy.

Źródła

• Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. 2021. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183
• Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. 2022. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206038
• Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani zwierząt. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani do użytku weterynaryjnego. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.