Opublikowane raporty dotyczące Oxytocin acetate


29 października 2026

Opublikowane raporty charakteryzują oxytocin acetate jako sól octanową endogennego hormonu nonapeptydowego, z solidnymi dowodami z randomizowanych badań oraz Cochrane dotyczącymi dożylnego stosowania w indukcji porodu, augmentacji i krwotoku poporodowym pre

Tożsamość chemiczna i kontekst katalogowy

Oxytocin acetate jest solą octanową cyklicznego nonapeptydu (Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH_2 z mostkiem disiarczkowym między Cys^1 i Cys^6), identyczną z endogenną ludzką oxytocin wytwarzaną w podwzgórzu i uwalnianą z tylnego płata przysadki. Działa jako selektywny agonista receptora oxytocin (OXTR), receptora sprzężonego z białkiem G sprzężonego z Gq, który wywołuje uwalnianie wewnątrzkomórkowego wapnia.

Opisanie badania z udziałem ludzi nie stanowi wskazówki do stosowania materiału badawczego w ten sposób. Materiały od Rierink Compounds są dostarczane wyłącznie do badań laboratoryjnych.




Schemat struktury chemicznej nonapeptydu oxytocin z mostkiem disiarczkowym.

Odkrycie fundamentalne, farmakologia receptorowa i

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani do użytku weterynaryjnego. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

mechanistyczne badania in vitro

Aktywność Oxytocin wywołująca skurcze macicy została zidentyfikowana przez Henry Dale w 1906 r. Strukturę wyjaśniono, a cząsteczkę po raz pierwszy zsyntetyzowano chemicznie w 1953 r.; dokonał tego Vincent du Vigneaud, który za to osiągnięcie oraz powiązane prace nad związkami siarki otrzymał w 1955 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Badania in vitro z użyciem izolowanych pasków macicy wykazały skurcze zależne od dawki, w których pośredniczy sygnalizacja IP_3 i wapnia indukowana przez OXTR. Klonowanie receptora na początku lat 90. XX wieku umożliwiło szczegółową charakterystykę farmakologiczną, wykazującą wysokie powinowactwo do oxytocin oraz niższą reaktywność krzyżową wobec receptorów vasopressin. Prace metodyczne udoskonaliły syntezę, stabilność w buforach octanowych oraz układy oznaczeń wiązania receptora i aktywności drugiego przekaźnika (in_vitro and method papers, 1906–2020s).




Schemat wewnątrzkomórkowej sygnalizacji, w której pośredniczy OXTR.

Przedkliniczne modele zwierzęce fizjologii rozrodu, zachowania społecznego, stresu i metabolizmu

Badania na gryzoniach i naczelnych innych niż człowiek określiły role w porodzie, wyrzucie mleka, zachowaniu matczynym, tworzeniu więzi partnerskich (np. modele prairie vole), wygaszaniu strachu, modulacji osi HPA oraz antynocycepcji. Myszy z knock-outem OXTR wykazują głębokie deficyty w rozpoznawaniu społecznym i opiece matczynej. Modele zwierzęce otyłości i dysfunkcji metabolicznej wykazały zmienne efekty dotyczące apetytu i wydatku energetycznego. Modele stresu i uzależnienia opisują zmniejszone zachowania lękopodobne

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani do użytku weterynaryjnego. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

oraz zmienione poszukiwanie substancji przy manipulacji egzogenną lub endogenną oxytocin (animal papers, 1960s–2026). Ustalenia te dostarczyły mechanistycznego uzasadnienia dla translacyjnych badań na ludziach, lecz uwypukliły istotne różnice gatunkowe, płciowe i kontekstowe.




Abstrakcyjne przedstawienie typów badań przedklinicznych.

Kluczowe badania randomizowane oraz syntezy Cochrane dotyczące wskazań położniczych

Setki randomizowanych badań kontrolowanych oraz liczne sieciowe metaanalizy Cochrane (w tym przeglądy obejmujące 61 badań dotyczących indukcji porodu i 122 badania z udziałem >120,000 kobiet w zakresie zapobiegania krwotokowi poporodowemu) ustalają dożylny lub domięśniowy oxytocin acetate jako standard opieki w augmentacji porodu oraz zmniejszeniu utraty krwi 500mL. Schematy wysokodawkowe mogą skracać czas trwania porodu i zmniejszać częstość chorioamnionitis bez zwiększania odsetka cięć cesarskich, gdy monitorowanie płodu jest wystarczające. W warunkach niskich zasobów i ograniczonego monitorowania augmentacja oxytocin była związana ze zwiększonym ryzykiem porodu martwego, niskich punktacji w skali Apgar, resuscytacji noworodkowej i encefalopatii, prawdopodobnie za pośrednictwem nierozpoznanej hiperstymulacji (clinical and meta-analysis papers, 1960s–2026). Kombinacje takie jak ergometrine plus oxytocin lub misoprostol plus oxytocin niekiedy zajmują wyższą pozycję w zapobieganiu krwawieniu.

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani do użytku weterynaryjnego. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.



Schematyczny przegląd projektów randomizowanych badań w poszczególnych wskazaniach.


Eksploracyjne badania donosowe z zakresu farmakologii klinicznej, neuropsychiatrii i metabolizmu

Oxytocin podawany donosowo (typowo 18–48 IU lub wyższe wartości w protokołach badawczych) badano w setkach badań pod kątem wpływu na rozpoznawanie emocji, zaufanie, empatię i istotność społeczną. W zaburzeniu ze spektrum autyzmu wyniki są mieszane: niektóre wcześniejsze i mniejsze badania lub metaanalizy opisywały poprawę reaktywności społecznej (szczególnie u młodszych dzieci), natomiast duże randomizowane badanie u dzieci (n 290) nie wykazało ogólnej korzyści w pierwotnej skali reaktywności społecznej ocenianej przez opiekuna, choć interakcja z wiekiem sugerowała możliwe sygnały w podgrupie 3–5 lat. Metaanalizy badań ASD wykazują małe lub nieistotne statystycznie efekty względem objawów osiowych po uwzględnieniu heterogeniczności i błędu systematycznego.

W schizofrenii metaanalizy wskazują na niewielki efekt w zakresie objawów negatywnych. Randomizowane badania w zaburzeniach związanych z używaniem substancji (17 badań dotyczących alkoholu, opioidów, stymulantów, konopi i nikotyny) wykazały niespójne zmniejszenie głodu substancji, objawów odstawienia lub spożycia (wynik dodatni w 3–4 z 11 badań w danej domenie), przy wysokim ryzyku błędu systematycznego. Wieloośrodkowe RCT z 2026 r. w zaburzeniu używania alkoholu (n=100, do 70 IU/day) nie wykazało istotnego zmniejszenia liczby dni intensywnego picia, lecz odnotowano wtórne korzyści w zakresie gniewu i agresji; związek był dobrze tolerowany. Metaanaliza badań spożycia pokarmu wykazała zmniejszone spożycie u uczestników bez zaburzeń psychiatrycznych, lecz efekty zerowe w

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani do użytku weterynaryjnego. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

zaburzeniach odżywiania lub schizofrenii. Metaanalizy dotyczące bólu są mieszane: analiza zbiorcza trzech małych RCT nie wykazała istotnego zmniejszenia natężenia bólu (g=0.31, 95% CI −0.10 to 0.73), choć przegląd narracyjny sugerował możliwe korzyści w określonych stanach, takich jak ból pleców lub migrena. Ogólne wielkości efektu w szerokich metaanalizach psychiatrycznych są małe (d 0.17–0.32) i silnie zależne od kontekstu, dawki, płci i historii (hipoteza istotności społecznej), a wiele większych nowszych badań daje wyniki zerowe dla pierwszorzędowych punktów końcowych (clinical pharmacology, RCT, and meta-analysis papers, 1991–2026).



Ilustracja syntezy dowodów w różnych typach badań.

Profil bezpieczeństwa, farmakokinetyka i tolerancja

Oksytocyna podawana dożylnie wymaga monitorowania szpitalnego jako lek wysokiego ryzyka (high-alert). Udokumentowane ryzyka obejmują tachysystolię/hiperstymulację macicy, zatrucie wodne z hiponatremią (zwłaszcza przy przedłużonym wlewie w wysokiej dawce i płynach hipotonicznych), arytmie, niedociśnienie lub nadciśnienie oraz potencjalne zagrożenie płodu lub powikłania noworodkowe. Pęknięcie macicy jest rzadkim, lecz poważnym ryzykiem w określonych scenariuszach położniczych. Podanie donosowe w warunkach badawczych (dawki pojedyncze lub powtarzane przez okres do kilku tygodni) wywołuje zdarzenia niepożądane (podrażnienie nosa, ból głowy, pragnienie, łagodne zmiany behawioralne), które są na ogół łagodne i statystycznie nieodróżnialne od placebo u zdrowych osób dorosłych, starszych mężczyzn oraz w niektórych populacjach klinicznych. Przewlekłe stosowanie donosowe u osób starszych nie wykazało istotnego wpływu na parametry sercowo-naczyniowe, moczowe ani

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani do użytku weterynaryjnego. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

metaboliczne. Dane farmakokinetyczne wskazują na krótki okres półtrwania w osoczu (3–6min po podaniu dożylnym; postuluje się dłuższe efekty ośrodkowe), niską i wysoce zmienną biodostępność donosową do ośrodkowego układu nerwowego (0.7–3%w czułych oznaczeniach), co przyczynia się do niespójnego przełożenia klinicznego. Przeglądy systematyczne bezpieczeństwa podania donosowego u >1,500 uczestników (1990–2011 i późniejsze aktualizacje) potwierdzają brak wiarygodnego profilu działań niepożądanych odróżniającego się od placebo przy dawkach badawczych oraz brak konsekwentnych poważnych niekorzystnych wyników w krótkotrwałym kontrolowanym stosowaniu (prace dotyczące bezpieczeństwa, PK, przeglądy i prace obserwacyjne, 1990–2026).

Najnowsze przeglądy systematyczne, metaanalizy, kontekst dowodów i powtarzające się ograniczenia

Najnowsze syntezy (2011–2026) potwierdzają wysokie stopnie wiarygodności dowodów dla wskazań położniczych, jednocześnie charakteryzując zastosowania neuropsychiatryczne i metaboliczne jako obiecujące, lecz niejednoznaczne. Metaanalizy wieloświatowe wykazują, że zbiorcze wielkości efektu mogą się dramatycznie różnić (d od −0.16 do 1.45) w zależności od wyborów analitycznych, populacji (neurotypowa vs kliniczna), schematu dawkowania (pojedyncze vs powtarzane) oraz korekt błędu publikacyjnego. Powtarzające się ograniczenia obejmują wysoką zmienność międzyosobniczą wchłaniania donosowego, krótki okres półtrwania, zależność od kontekstu (wyjściowe stężenia oksytocyny, przeciwności w dzieciństwie, płeć, otoczenie społeczne), małe liczebności prób w wielu badaniach psychiatrycznych, potencjalny błąd publikacyjny oraz trudności w zaślepieniu wynikające z subtelnych efektów percepcyjnych. Heterogeniczność uniemożliwia stanowcze wnioski dla większości zastosowań niepołożniczych. Nie istnieje zatwierdzenie regulacyjne dla zastosowań donosowych ani fiolek badawczych poza szpitalnymi warunkami położniczymi. Trwające badania nadal doprecyzowują stratyfikację pacjentów, optymalne dawkowanie oraz łączenie z interwencjami behawioralnymi. Przyszłe prace wymagają większych, odpowiednio mocy badań z ulepszonymi metodami podawania i jasno określonymi z góry podgrupami (prace przeglądowe i metaanalityczne, 2011–2026).

Zespół dowodów podkreśla oxytocin acetate jako podstawowy uterotonik o długiej historii bezpieczeństwa pod nadzorem, podczas gdy efekty ośrodkowe pozostają aktywnym obszarem badań farmakologicznych z istotnymi ograniczeniami metodycznymi i biologicznymi. (Liczba słów 1,750)

Źródła

• Effects of intranasal oxytocin in food intake and craving: A meta-analysis of clinical trials, 2021. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.08.011
• The effectiveness of oxytocin for treating substance use disorders: A systematic review of randomized placebo-controlled trials, 2023. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105185
• Evaluating the efficacy of oxytocin for pain management: An updated systematic review and meta-analysis, 2023. https://doi.org/10.1080/24740527.2023.2191114
• The effect of oxytocin nasal spray on social interaction in young children with autism: a randomized clinical trial, 2023. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01845-8
• Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis, 2025.

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani do użytku weterynaryjnego. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD011689.pub4
• A review of safety, side-effects and subjective reactions to intranasal oxytocin in human research, 2011. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2011.02.006
• A multiverse meta-analysis of oxytocin administration studies, 2025. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2025.108489

Wszystkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani w weterynarii. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, łagodzenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Wszelkie omawiane informacje i produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i badawczego. Nie do stosowania u ludzi ani do użytku weterynaryjnego. Nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, wyleczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.