# Relatos de ensaios clínicos sobre mazdutide

21 de outubro de 2026

Quatro artigos clínicos relataram alterações do peso corporal ou da HbA1c com mazdutide em comparação com placebo ou dulaglutide, cada um com limitações declaradas de população e de segurança.




Os relatos publicados sobre mazdutide abaixo limitam-se ao que os artigos citados declararam. Cada item indica o tipo de estudo e uma limitação do registo consultado. As alterações numéricas são resultados de estudo, não afirmações de utilização clínica.

**Clínico.** Um ensaio de fase 3, em dupla ocultação e controlado por placebo, em adultos chineses com obesidade, com ou sem diabetes tipo 2, relatou uma alteração média do peso corporal de −16,65% no grupo mazdutide versus −1,50% com placebo ao longo de 60 semanas. O ensaio foi realizado em 27 hospitais na China, com dieta e atividade como adjuvantes. Acontecimentos adversos levaram à descontinuação do tratamento em 2,9% do grupo mazdutide versus 0% com placebo. O registo não estabelece resultados fora dessa população do ensaio.

**Clínico.** Um ensaio de fase 2, multicêntrico nos EUA e controlado por placebo, relatou alterações do peso corporal, em média dos mínimos quadrados, às 32 semanas, de −7,3%, −15,6% e −18,1% em três braços de mazdutide, versus −0,9% com placebo. A amostra foi de 179 participantes. Os acontecimentos gastrointestinais foram os acontecimentos adversos mais frequentes, e a descontinuação do tratamento foi mais frequente no braço de dose mais elevada (20%). O resumo não relata resultados para além do seguimento indicado.

**Clínico.** Um ensaio de fase 3 em adultos chineses com diabetes tipo 2 sob antidiabéticos orais de base relatou que dois braços de mazdutide foram superiores à dulaglutide quanto à alteração da HbA1c às 28 semanas, com diferenças médias dos mínimos quadrados de −0,24% e

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

−0,30%. O comparador foi a dulaglutide durante 28 semanas numa população de ensaio chinesa. Os acontecimentos adversos emergentes do tratamento mais frequentes foram diarreia, náuseas e vómitos.

**Clínico.** Num ensaio de fase 3 em monoterapia em adultos chineses com diabetes tipo 2 inadequadamente controlada por dieta e exercício, as alterações da HbA1c à semana 24 foram de −1,57% e −2,15% em dois braços de mazdutide versus −0,14% com placebo. A comparação primária foi de 24 semanas de controlo com placebo em adultos chineses. Os acontecimentos adversos frequentes foram diarreia, diminuição do apetite e náuseas. O resumo não relata dados de resultados cardiovasculares.

## Fontes

• Treatment With 9-mg Mazdutide for Weight Reduction in Chinese Adults With Obesity: The GLORY-2 Randomized Clinical Trial (2026). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42251595/
• Efficacy and safety of mazdutide in adults with obesity or overweight: a US-based, multicentre, phase 2, randomised, placebo-controlled clinical trial (2026). https://doi.org/10.1016/S2213-8587(26)00160-9
• Mazdutide versus dulaglutide in Chinese adults with type 2 diabetes (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-025-10031-z
• Mazdutide versus placebo in Chinese adults with type 2 diabetes (2026). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41407859/

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.