
Relatórios de ensaios clínicos sobre três péptidos relacionados com incretinas

21 de outubro de 2026

Artigos clínicos indexados sobre semaglutido, tirzepatido e retatrutido reportaram diferenças entre braços atribuídos na variação percentual do peso corporal e registaram acontecimentos adversos. Cada nota indica o tipo de estudo e uma limi



Semaglutido

Tipo de estudo: clínico. Wilding e colegas (2021) reportaram um ensaio aleatorizado, em dupla ocultação, controlado por placebo, em adultos com excesso de peso ou obesidade e sem diabetes. Às 68 semanas, o artigo reportou uma redução percentual média do peso corporal maior no braço de semaglutido do que no braço de placebo, e os acontecimentos gastrointestinais foram registados com maior frequência no braço ativo. Limitação: uma população selecionada e uma janela de seguimento fixa; o relatório não estabelece resultados fora desse desenho.

Tirzepatido

Tipo de estudo: clínico. Jastreboff e colegas (2022) reportaram um ensaio de fase 3 aleatorizado em adultos com obesidade, ou excesso de peso mais uma condição relacionada com o peso, e sem diabetes. O artigo reportou variações percentuais médias do peso corporal maiores nos braços atribuídos de tirzepatido do que com placebo às 72 semanas, com acontecimentos gastrointestinais entre os acontecimentos registados. Limitação: os critérios de elegibilidade e a duração do ensaio restringem até onde as diferenças medidas podem ser lidas.

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Retatrutido

Tipo de estudo: clínico. Jastreboff e colegas (2023) reportaram um ensaio aleatorizado de fase 2. O artigo reportou variação percentual do peso corporal às 48 semanas que diferiu entre os braços atribuídos de retatrutido e o placebo, e registou acontecimentos gastrointestinais. Limitação: dimensão e duração de fase 2; o artigo não é um conjunto de dados de fase posterior concluído.

Fontes

• Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. 2021. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183
• Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. 2022. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206038
• Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.