Relatos publicados sobre o acetato de ocitocina


29 de outubro de 2026

Relatos publicados caracterizam o acetato de ocitocina como o sal de acetato da hormona nonapeptídica endógena, com evidência robusta de ensaios aleatorizados e da Cochrane para utilização intravenosa na indução do trabalho de parto, na ace

Identidade química e contexto de catálogo

O acetato de ocitocina é o sal de acetato do nonapeptídeo cíclico (Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH_2 com uma ponte dissulfureto entre Cys^1 e Cys^6), idêntico à ocitocina humana endógena produzida no hipotálamo e libertada pela hipófise posterior. Atua como agonista seletivo do recetor da ocitocina (OXTR), um recetor acoplado à proteína G do tipo Gq que desencadeia a libertação intracelular de cálcio.

Relatar um ensaio em humanos não constitui orientação para utilizar o material de investigação dessa forma. Os materiais da Rierink Compounds são fornecidos estritamente para investigação laboratorial.




Esquema da estrutura química do nonapeptídeo ocitocina com ponte dissulfureto.

Descoberta fundacional, farmacologia do recetor e estudos mecanísticos in vitro

A atividade uterocontráctil da ocitocina foi identificada por Henry Dale em 1906. A estrutura foi elucidada e a molécula sintetizada quimicamente pela primeira vez em 1953 por Vincent du

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Vigneaud, que recebeu o Prémio Nobel da Química de 1955 por este feito e por trabalhos relacionados com compostos de enxofre. Estudos in vitro com tiras uterinas isoladas demonstraram contrações dependentes da dose, mediadas pela sinalização de IP_3 e cálcio induzida pelo OXTR. A clonagem do recetor no início da década de 1990 permitiu uma caracterização farmacológica pormenorizada, mostrando elevada afinidade para a ocitocina e menor reatividade cruzada com os recetores da vasopressina. Artigos metodológicos refinaram a síntese, a estabilidade em tampões de acetato e os sistemas de ensaio para a ligação ao recetor e a atividade de segundos mensageiros (artigos in vitro e metodológicos, 1906–década de 2020).




Esquema da sinalização intracelular mediada pelo OXTR.

Modelos animais pré-clínicos de fisiologia reprodutiva, comportamento social, stress e metabolismo

Estudos em roedores e primatas não humanos mapearam papéis no parto, na ejeção do leite, no comportamento maternal, na ligação de par (por exemplo, modelos de ratazana-do-campo), na extinção do medo, na modulação do eixo HPA e na antinociceção. Ratinhos knockout para o OXTR apresentam défices profundos no reconhecimento social e nos cuidados maternais. Modelos animais de obesidade e disfunção metabólica mostraram efeitos variáveis no apetite e no dispêndio energético. Modelos de stress e de adição relatam redução do comportamento do tipo ansioso e alteração da procura de droga com manipulação da ocitocina exógena ou endógena (artigos em animais, década de 1960–2026). Estes resultados forneceram fundamentação mecanística para a investigação translacional em humanos, mas salientaram diferenças importantes entre espécies, sexos e contextos.

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.




Representação abstrata de tipos de estudo pré-clínico.

Ensaios aleatorizados fundamentais e sínteses da Cochrane para indicações obstétricas

Centenas de ensaios clínicos aleatorizados e várias meta-análises em rede da Cochrane (incluindo revisões que abrangem 61 ensaios sobre indução do trabalho de parto e 122 ensaios com mais de 120 000 mulheres sobre prevenção da hemorragia pós-parto) estabelecem o acetato de ocitocina intravenoso ou intramuscular como padrão de cuidados para a aceleração do trabalho de parto e a redução da perda de sangue 500mL. Regimes de dose elevada podem encurtar a duração do trabalho de parto e reduzir a corioamnionite sem aumentar as taxas de cesariana quando a monitorização fetal é adequada. Em contextos de baixos recursos, com monitorização limitada, a aceleração com ocitocina foi associada a aumento dos riscos de nado-morto, índices de Apgar baixos, reanimação neonatal e encefalopatia, provavelmente mediados por hiperestimulação não reconhecida (artigos clínicos e de meta-análise, década de 1960–2026). Associações como ergometrina mais ocitocina ou misoprostol mais ocitocina classificam-se por vezes melhor na prevenção da hemorragia.

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.



Visão esquemática de desenhos de ensaios aleatorizados em várias indicações.

Farmacologia clínica exploratória por via intranasal e ensaios neuropsiquiátricos e metabólicos

A ocitocina intranasal (tipicamente 18–48 UI, ou mais, em protocolos de investigação) foi testada em centenas de estudos quanto a efeitos no reconhecimento de emoções, na confiança, na empatia e na saliência social. Na perturbação do espetro do autismo, os resultados são mistos: alguns ensaios anteriores e de menor dimensão, ou meta-análises, relataram melhorias na responsividade social (em particular em crianças mais novas), enquanto um grande ensaio aleatorizado em crianças (n 290) não encontrou benefício global na escala primária de responsividade social avaliada pelo cuidador, embora uma interação com a idade sugerisse possíveis sinais no subgrupo dos 3–5 anos. Meta-análises de ensaios na PEA mostram efeitos pequenos ou não significativos nos sintomas nucleares após consideração da heterogeneidade e do viés.

Na esquizofrenia, meta-análises indicam um efeito pequeno nos sintomas negativos. Ensaios aleatorizados em perturbações por uso de substâncias (17 ensaios sobre álcool, opioides, estimulantes, canábis e nicotina) relataram reduções inconsistentes do craving, da abstinência ou do consumo (positivas em 3–4 de 11 ensaios por domínio), com elevado risco de viés. Um ECR multicêntrico de 2026 na perturbação por uso de álcool (n=100, até 70 UI/dia) não encontrou redução significativa dos dias de consumo excessivo, mas registou benefícios secundários na ira e na agressão; o composto foi bem tolerado. Uma meta-análise de ensaios sobre ingestão alimentar mostrou redução da ingestão em participantes sem patologia psiquiátrica, mas efeitos nulos nas perturbações do comportamento alimentar ou na

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

esquizofrenia. As meta-análises sobre dor são mistas: uma análise agrupada de três pequenos ECR não mostrou redução significativa da intensidade da dor (g=0,31, IC 95% −0,10 a 0,73), embora uma revisão narrativa sugerisse possíveis benefícios em condições específicas, como dor lombar ou enxaqueca. Os tamanhos de efeito globais em meta-análises psiquiátricas amplas são pequenos (d 0,17–0,32) e muito dependentes do contexto, da dose, do sexo e da história (hipótese da saliência social), com muitos ensaios recentes de maior dimensão a devolver resultados nulos nos critérios de avaliação primários (artigos de farmacologia clínica, ECR e meta-análise, 1991–2026).




Ilustração da síntese de evidência entre tipos de estudo.

Perfil de segurança, farmacocinética e tolerabilidade

A ocitocina intravenosa exige monitorização hospitalar enquanto medicamento de alerta elevado. Os riscos documentados incluem taquissistolia/hiperestimulação uterina, intoxicação hídrica com hiponatremia (sobretudo com perfusão prolongada em dose elevada e fluidos hipotónicos), arritmias, hipotensão ou hipertensão, e potencial sofrimento fetal ou complicações neonatais. A rotura uterina é um risco raro mas grave em determinados cenários obstétricos. A administração intranasal em contextos de investigação (doses únicas ou repetidas até várias semanas) produz acontecimentos adversos (irritação nasal, cefaleia, sede, alterações comportamentais ligeiras) que são em geral ligeiros e estatisticamente indistinguíveis do placebo em adultos saudáveis, homens mais velhos e algumas populações clínicas. O uso intranasal crónico em adultos mais velhos não mostrou impacto significativo em parâmetros cardiovasculares, urinários ou metabólicos. Os dados farmacocinéticos indicam uma semivida plasmática curta (3–6 min após administração IV; postulam-se efeitos centrais mais

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

prolongados), biodisponibilidade intranasal baixa e muito variável para o sistema nervoso central (0,7–3%em ensaios sensíveis), o que contribui para uma translação clínica inconsistente. Revisões sistemáticas da segurança intranasal em mais de 1500 participantes (1990–2011 e atualizações posteriores) confirmam a ausência de um perfil fiável de efeitos secundários distinto do placebo nas doses de investigação e a ausência de resultados adversos graves consistentes no uso controlado de curta duração (artigos de segurança, FC, revisão e observação, 1990–2026).

Revisões sistemáticas recentes, meta-análises, contexto da evidência e limitações recorrentes

Sínteses recentes (2011–2026) confirmam graus de evidência fortes para as indicações obstétricas, ao mesmo tempo que caracterizam as aplicações neuropsiquiátricas e metabólicas como promissoras, mas inconclusivas. Meta-análises multiverso demonstram que os tamanhos de efeito sumários podem variar de forma dramática (d de −0,16 a 1,45) consoante as escolhas analíticas, a população (neurotípica versus clínica), o regime posológico (único versus repetido) e as correções para viés de publicação. As limitações recorrentes incluem elevada variabilidade interindividual na absorção nasal, semivida curta, dependência do contexto (níveis basais de ocitocina, adversidade na infância, sexo, enquadramento social), amostras de pequena dimensão em muitos ensaios psiquiátricos, potencial viés de publicação e dificuldades de ocultação devido a efeitos percetivos subtis. A heterogeneidade impede conclusões firmes para a maioria dos usos não obstétricos. Não existe aprovação regulamentar para aplicações intranasais ou de frascos de investigação fora do contexto obstétrico hospitalar. Ensaios em curso continuam a refinar a estratificação de doentes, a posologia ótima e a combinação com intervenções comportamentais. O trabalho futuro exige estudos de maior dimensão e bem potenciado, com melhores métodos de administração e subgrupos pré-especificados claros (artigos de revisão e meta-análise, 2011–2026).

O conjunto da evidência sublinha o acetato de ocitocina como uterotónico de referência, com um longo registo de segurança sob supervisão, enquanto os efeitos centrais permanecem uma área ativa de investigação farmacológica, com importantes condicionantes metodológicas e biológicas. (Contagem de palavras 1,750)

Fontes

• Effects of intranasal oxytocin in food intake and craving: A meta-analysis of clinical trials, 2021. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.08.011
• The effectiveness of oxytocin for treating substance use disorders: A systematic review of randomized placebo-controlled trials, 2023. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105185
• Evaluating the efficacy of oxytocin for pain management: An updated systematic review and meta-analysis, 2023. https://doi.org/10.1080/24740527.2023.2191114
• The effect of oxytocin nasal spray on social interaction in young children with autism: a randomized clinical trial, 2023. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01845-8
• Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis, 2025. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011689.pub4
• A review of safety, side-effects and subjective reactions to intranasal oxytocin in human research, 2011. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2011.02.006

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

• A multiverse meta-analysis of oxytocin administration studies, 2025. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2025.108489

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.