
Relatos de estudos sobre a retatrutida em dois artigos de fase 2 de 2023

20 de outubro de 2026

Uma nota breve para investigadores sobre o que dois ensaios de fase 2 publicados relataram acerca da retatrutida, com o tipo de estudo e uma limitação para cada um. Sem orientação de utilização.



Esta nota regista resultados publicados sobre a retatrutida. Não recomenda a utilização em pessoas ou animais.

Ensaio na obesidade (clínico)

Jastreboff e colegas (2023) relataram um ensaio de fase 2 aleatorizado, em dupla ocultação e controlado por placebo em adultos com obesidade, ou com excesso de peso e pelo menos uma condição relacionada com o peso, e sem diabetes tipo 2. O artigo relatou a variação percentual do peso corporal às 24 semanas como critério de avaliação primário e também relatou a variação do peso às 48 semanas. Os acontecimentos gastrointestinais figuraram entre os acontecimentos adversos descritos. Limitação: a dimensão e o seguimento de fase 2 não estabelecem resultados a mais longo prazo, e esta nota não reitera os grupos de dose.

Ensaio na diabetes tipo 2 (clínico)

Rosenstock e colegas (2023) relataram um ensaio de fase 2 aleatorizado, em dupla ocultação, controlado por placebo e por comparador ativo em adultos com diabetes tipo 2. O dulaglutido foi o comparador ativo nomeado no artigo. Os critérios de avaliação relatados incluíram a variação da hemoglobina glicada e a variação do peso corporal; os acontecimentos

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

gastrointestinais figuraram entre os acontecimentos adversos enumerados. Limitação: população e duração selecionadas de fase 2; os critérios de avaliação medidos no ensaio não constituem uma declaração de utilização indicada.

Não são aqui resumidos artigos in vitro nem em modelo animal.

Fontes

• Triple–Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity — A Phase 2 Trial. 2023. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2301972
• Retatrutide, a GIP, GLP-1 and glucagon receptor agonist, for people with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo and active-controlled, parallel-group, phase 2 trial. 2023. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01053-X

Toda a informação e os produtos referidos destinam-se exclusivamente a utilização laboratorial e de investigação. Não se destinam a uso humano ou veterinário. Não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.